

مزالازین، سایه‌بانی ایمن برای رهایی از کولیت اولسراتیو



Reference:

- Drug facts & comparisons 2016; Vol. (III); pages: 2105-2109
- USPDI: Advice for the patient 2007 27th Edition; Vol. (II); pages:1056-1058



قرص مزالازین

Mesalazine



شرکت داروسازی ایران هورمون
IRAN HORMONE PHARMACEUTICAL Co.



دارای گواهینامه ISO 9001-2008
دارای گواهینامه اشتهار به کیفیت
دومین دوره جایزه ملی کیفیت غذا
دارو و بهداشت ایران

Finooz Group Printing - 9821 88 80 86 11

شرکت داروسازی ایران هورمون

تهران، کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، صندوق پستی: ۱۷۶۷-۱۳۱۸۵
تلفن: ۹-۱۷ ۵۵ ۴۴ ۹۰ (۰۲۱) فکس: ۱۲ ۵۵ ۴۴ ۹۰ (۰۲۱)
صدای مشتری: داخلی ۳۵۸
www.iranhormone.com info@iranhormone.com

توزیع و پخش در داروخانه‌های سراسر کشور توسط:
پخش فردوس، داروگستر نخچگان، محیا دارو، رازی، قاسم ایران و البرز

شرکت داروسازی ایران هورمون
IRAN HORMONE PHARMACEUTICAL Co.

شرکت داروسازی ایران هورمون
IRAN HORMONE PHARMACEUTICAL Co.

عوارض جانبی:

آکنه، بثورات جلدی، استفراغ، سوءهاضمه، درد شکمی، تهوع، سر درد، اسهال، اختلال خونی، گیجی و تب، نازوفارنژیت، فارنژیت، تشدید کولیت اولسراتیو، آروغ

موارد منع مصرف و احتیاط:

موارد منع مصرف: در صورت وجود حساسیت مفرط به سالیسیلات‌ها و مشکل در کار کلیه نباید مصرف شود.

موارد احتیاط: مشکلات قلبی (میوکاردیت و پریکاردیت)

مصرف در بارداری:

گروه B/C (product specific)

مصرف در شیردهی:

در شیر مادر ترشح می‌شود، لذا دارو در دوران شیردهی با احتیاط و فقط با نظر پزشک معالج مصرف شود.

مزایا:

از آنجایی که مزالازین بخش سولفاپیریدین داروی سولفاسالازین را دارا نیست، عوارض مربوط به ترکیبات سولفا مانند واکنش‌های حساسیتی، افزایش حساسیت به نور و تغییر رنگ پوست با مصرف آن مشاهده نمی‌شود و تحمل آن برای بیمار آسان‌تر است.

- مزالازین یک داروی ضد التهاب انتخابی است که بطور وسیعی در درمان التهاب روده و پیشگیری از عود یا پیشرفت بیماری تجویز می‌گردد.

- مزالازین مخاط روده را میپوشاند و التهاب را کم می‌کند.

- مزالازین در محل مورد نظر که روده میبازد اثر خود را القا می‌نماید.

- مزالازین در ۳۵-۵۰٪ با کولیت السراتیو خفیف تا متوسط سبب القا بهبودی می‌گردد و همچنین در ۵۵-۷۵٪ درصد بیماران بهبودی بیش از ۶ ماه ادامه می‌یابد.

شرایط نگهداری:

دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری کنید.

مزالازین

نام ژنریک:

Mesalazine، مزالازین

دسته دارویی:

مشتقات ۵-آمینو سالیسیک اسید

شکل دارویی:

قرص انتریک کتود قهوه‌ای رنگ حاوی ۵۰۰ میلی‌گرم مزالازین

مکانیسم اثر:

مزالازین اثر ضد التهاب دارد. در بیماری‌های مزمن التهابی روده افزایش متابولیت‌های مسیر آراشیدونیک اسید در هر دو مسیر سیکلو اکسیژناز و لیبو اکسیژناز مشاهده می‌شود که به نظر می‌رسد مزالازین از طریق مهار سیکلو اکسیژناز و کاهش تولید پروستاگلندین در کولون باعث کنترل التهاب می‌شود.

فارماکو کینتیک:

جذب: مزالازین بدنبال مصرف خوراکی ۲۰ تا ۳۰٪ جذب می‌شود. غذا تاثیری بر جذب دارو ندارد. توزیع: ۸۰٪ متابولیت مزالازین (N-Ac-5-ASA) اتصال پروتئینی دارد. متابولیسم: داروی جذب شده به سرعت و بطور وسیعی در مخاط روده و کبد متابولیزه می‌شود. دفع: حدود ۲۸٪ مزالازین از طریق مدفوع دفع می‌شود. مزالازین بطور عمده بصورت متابولیت N-Ac-5-ASA از طریق کلیه دفع می‌شود. در حالت پایدار، میانگین نیمه عمر حذفی مزالازین ۷ ساعت است.

موارد و میزان مصرف:

- درمان کولیت اولسراتیو حاد: ۱ گرم روزی ۴ بار از راه خوراکی تا ۸ هفته.

- پیشگیری از عود بیماری کولیت اولسراتیو: ۱ گرم روزی ۴ بار از راه خوراکی تا ۸ هفته.

تداخل دارویی:

مهارکننده‌های پمپ پروتون، آنتی‌اسیدها، گلیکوزیدهای قلبی، آنتاگونیست‌های هیستامین، آزاتیوپرین، مرکاپتوپورین، تیوگوانین، هپارین، اتوکسپارین
- ضد التهاب‌های غیر استروئیدی - واکسن واریسل‌زوستر