

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای جلوگیری از بارداری در شرایط اورژانسی (در خانم هایی که مقاربت پیشگیری نشده داشته باشند یا به روش پیشگیری مشکوک می باشند) مصرف می شود.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

– وجود هر نوع حساسیت به پروژستین ها، غذاها، مواد محافظ و رنگ ها.
– در صورت داشتن هر نوع رژیم، مثل داشتن رژیم کم نمک یا کم شیرین.
– در صورت مصرف داروهای زیر:
آمینوگلوتمید، کاربامازپین، فنوباریتال، فنی توئین، ریفابوتین، ریفامپین، پریمیدون و توپیرامات.

– در صورت داشتن سابقه ابتلا به بیماری هایی مانند اختلالات ترومبوآمبولیک، ترومبوفلیت، بیماری های عروق مغزی و عروق کرونر، انفارکتوس میوکارد، سرطان رحم، تومورهای کبدی بدخیم یا خوش خیم، خونریزی واژینال با علت نامعلوم، هایپر تانسیون کنترل نشده، سردرد با علایم عصبی فوکال، دیابت همراه با مشکلات عروقی، یرقان کلستاتیک، سابقه یرقان در دوران بارداری، پورفیری حاد و همچنین در موارد قطعی یا مشکوک به سرطان سینه و در صورت انجام اعمال جراحی که نیاز به استراحت طولانی مدت دارد حتماً با پزشک خود مشورت نمایید، زیرا مصرف این دارو در این موارد ممنوع می باشد.
– در صورت بارداری و شیردهی.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:

– مصرف این دارو هیچ گونه اثر محافظتی در مقابل بیماری های آمیزشی نظیر HIV ندارد.
– چنانچه طی ۲ ساعت پس از مصرف دارو استفراغ رخ دهد، مصرف دارو می بایست تکرار شود.
– این دارو در افراد دارای سابقه افسردگی، سندرم سوء جذب شدید، بارداری خارج رحمی، بیماری های تروفوبلاستیک (مربوط به جفت) و افراد مبتلا به هایپرلیپیدمی، آسم و صرع می بایست با احتیاط مصرف شود.
– این نوع کنتراستپتیوها دقیقاً پس از مقاربت کنترل نشده مصرف می شوند و برای مصرف مداوم و طولانی بکار نمی روند.

مصرف در بارداری:

مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع می باشد.

مصرف در شیردهی:

مصرف این دارو ۶ هفته پس از زایمان بلامانع می باشد.

مقدار مصرف دارو:

۱) در صورت استفاده از قرص ۰/۷۵ میلی گرم: اولین قرص هر چه زودتر پس از مقاربت مصرف شود. (فاصله و زمان مصرف قرص از زمان مقاربت نباید بیش از ۱۲۰ ساعت یا ۵ روز باشد) و قرص دوم درست ۱۲ ساعت پس از اولین قرص مصرف گردد. در صورتی که دو قرص هم زمان با هم مصرف شوند اثر بخشی بهتر می باشد.

۲) در صورت استفاده از قرص ۱/۵ میلی گرم: ۱ عدد قرص هرچه زودتر پس از مقاربت مصرف شود (فاصله و زمان مصرف قرص از زمان مقاربت نباید بیش از ۱۲۰ ساعت یا ۵ روز باشد).

نکته: جدول زیر به میزان اثر بخشی استفاده از این روش در چند مرجع علمی اشاره دارد با توجه به مطالب ذکر شده در جدول توصیه می گردد جهت دست یابی به اثر بخشی بیشتر دارو به اصل استفاده ((هرچه زودتر، بهتر)) توجه گردد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود.

اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید.

بیشترین عوارض جانبی مشاهده شده پس از مصرف این دارو تهوع، استفراغ، خستگی، سردرد، دردهای شکمی، حساس شدن پستان ها، اسهال و اختلال در قاعدگی می باشد.

شرایط نگهداری:

– دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

– دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

– از مصرف داروی تاریخ گذشته اجتناب نمایید.

اثر بخشی	صفحه	رفرنس
مصرف قرص تا ۷۲ ساعت به میزان ۸۴٪ و استفاده حد فاصل ۷۳ تا ۱۲۰ ساعت تا ۶۳٪ از بارداری ناخواسته پیشگیری می کند.	۱۹۴	Handbaook of Family Planning and Reproductive Healthcare-2008
در میان سیکل به دلیل احتمال بیشتر بارداری ۸۰-۷۰٪ و در سایر زمان ها بدون تفکیک بین ساعت مصرف ۹۶ تا ۹۸٪ از بارداری پیشگیری می نماید. ضمن اینکه مصرف در فاصله زمانی ۷۲ تا ۱۲۰ ساعت فقط ۶۰ تا ۶۳٪ از بارداری ناخواسته جلوگیری می نماید.	۱۶۲	Handbaook of Family Contraception and Reproductive Sexual Health-2008
بدون تفکیک بین ساعت مصرف این قرص تا ۹۹٪ از بارداری ناخواسته محافظت می نماید.	۴۶	Family Planning, A Global Handbook Fur Providers-2008
مصرف قرص تا ۷۲ ساعت تا ۹۸/۳٪ و استفاده حد فاصل ۷۳ تا ۱۲۰ ساعت تا ۹۷/۶٪ از بارداری ناخواسته پیشگیری می کند.	۴۷۴	John Gullebaud Contraception-Year Questions Answered 2009
بر اساس محاسبات WHO هر ۱۲ ساعت تاخیر تقریباً ۵٪ بارداری ناخواسته را (بر مبنای ضریب شکست اولیه روش) افزایش می دهد.	۴۷۵	
مصرف قرص تا ۷۲ ساعت تا ۹۷٪ از بارداری ناخواسته پیشگیری می کند و استفاده حد فاصل ۷۳ تا ۱۲۰ ساعت تا ۸۸٪	۹۷	Contraception Tecnology-2008

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، تهران، ایران

تلفن صدای مشتری: ۹-۱۷۵۵۱۰۴۴۹ داخلی ۳۵۸



BRC/ P- SH59- 01/ 02