

پیش از شروع مصرف نیزوپرد و هر بار که قرار است مصرف این دارو را تکرار نمایید برگه راهنما را مطالعه کنید زیرا ممکن است حاوی مطالب جدید باشد. این برگه راهنما جایگزین صحبت با پزشک یا داروساز در مورد بیماری و یا درمان آن نمی باشد.

نیزوپرد چیست و به چه منظور استفاده می شود:

نیزوپرد (ن-زوپرد) حاوی ۵ و ۵۰ میلی گرم ماده موثره پردنیزولون است. این دارو به خانواده کورتیکواستروئیدها (گلوکوکورتیکوئید) تعلق دارد و به عنوان یک ضد التهاب یا عامل سرکوب کننده سیستم ایمنی در مواقع واکنش حساسیتی، بیماری های پوستی، اختلالات غدد درون ریز، بیماری های گوارشی، اختلالات خونی، بیماری نئوپلاستیک، آسیب سیستم عصبی، بیماری های چشمی، اختلالات کلیوی، بیماری های تنفسی، اختلالات روماتوئیدی و پس زدن عضو پیوندی کاربرد دارد.

آنچه که باید پیش از مصرف نیزوپرد بدانید:

نیزوپرد برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران حتی در صورتی که علایم شبیه به شما دارند خودداری نمایید.

مواردی که این دارو را نباید مصرف کنید:

– در صورت وجود حساسیت به پردنیزولون و یا هرکدام از اجزای فرمولاسیون نباید دارو را مصرف کنید.

– در صورت فشار خون بالا، نارسایی احتقانی قلب، نارسایی کلیوی، دیابت شیرین، اختلال عملکرد کبدی، نارسایی حاد قلبی، بیماری صرع، پوکی استخوان، میاستنی گراویس، بیماری تیروئید و بیماری ایدز (HIV) به پزشک خود اطلاع دهید.

– در صورت مصرف داروی پروپرانولول به پزشک خود اطلاع دهید.

در طول مصرف این دارو باید بدانید:

– در طی دوره درمان به طور مرتب جهت بررسی پیشرفت درمان به پزشک خود مراجعه نمایید.

– بدون مشورت با پزشک خود مصرف دارو را قطع نکنید زیرا ممکن است کاهش تدریجی دوز نیاز باشد.

– در صورت ابتلا به کاتاراکت، هرپس سیمپلکس، گلوکوم و یا سایر بیماری های چشمی، این دارو را با احتیاط مصرف نمایید.

– اگر قرار است این دارو را برای مدت طولانی مصرف نمایید معاینات چشم پزشکی در طول درمان به طور مرتب باید انجام شود. همچنین ممکن است پزشک شما بخواهد از رژیم پیروی کنید که نمک آن کم و میزان پتاسیم در آن غنی باشد و یا میزان کالری دریافتی خود را کنترل و پروتئین مازاد به رژیم خود اضافه نمایید.

– اگر علایم شما پس از کاهش دوز و یا قطع دارو عود کرد یا بدتر شد با پزشک خود در میان بگذارید.

– قبل از انجام آزمایشات پوستی یا قبل از انجام هر نوع جراحی (از جمله جراحی دندان) یا درمان اورژانسی، به پزشک مسئول خود درباره استفاده از این دارو اطلاع دهید.

– در صورت ابتلا به عفونت یا جراحی جدی به پزشک خود اطلاع دهید.

– از تماس نزدیک با کسی که آبله مرغان یا سرخک دارد اجتناب کنید. اگر فکر می کنید در معرض آبله مرغان یا سرخک قرار گرفته اید بلافاصله به پزشک خود اطلاع دهید.

– در زمانی که تحت درمان با این دارو هستید و پس از قطع مصرف آن، بدون تأیید پزشک خود هیچگونه ایمن سازی (واکسیناسیون) انجام ندهید. همچنین سایر افرادی که در خانه با شما زندگی می کنند نباید واکسن فلج اطفال خوراکی دریافت کنند.

– این دارو ممکن است بر سطح گلوکز خون تأثیر بگذارد. اگر متوجه تغییر در نتایج آزمایش قند خون یا ادرار شده اید با پزشک خود مشورت کنید.

نیزوپرد را چگونه مصرف کنید:

مقدار مصرف داروی شما را پزشک تعیین می کند، تمامی دستورات پزشک یا داروساز خود را با دقت دنبال کنید. این دستورات ممکن است با اطلاعات موجود در این برگه راهنما متفاوت باشد.

چه مقدار مصرف کنید:

دوز عمومی: دوز بستگی به وضعیت درمانی و پاسخ بیمار دارد. دوز مصرفی برای نوزادان و کودکان باید بر اساس شدت بیماری و پاسخ بیمار باشد نه بر طبق راهنمایی های سختگیرانه ای دوزبندی که بر اساس سن، وزن و یا سطح بدن کودکان می باشد.

دوز معمول بزرگسالان: ۵ تا ۶ میلی گرم در روز

دوز معمول کودکان: ۰.۱ تا ۲ میلی گرم بر کیلوگرم (به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) در روز در ۳ یا ۴ دوز منقسم.

چطور مصرف کنید:

قرص را به طور کامل همراه یک لیوان آب مصرف کنید.

چه زمانی مصرف کنید:

برای کاهش ایجاد ناراحتی دستگاه گوارش، دارو را همراه یا بعد از غذا و یا شیر مصرف کنید.

برای چه مدت مصرف کنید:

مصرف دارو را تا زمان تعیین شده توسط پزشک خود ادامه دهید.

اگر مصرف دارو را فراموش کردید:

اگر برنامه مصرف دارو به صورت یک دوز یک روز در میان یا یک بار در روز است: در صورتی که صبح همان روز به یاد آوردید، هرچه سریعتر دارو را مصرف کنید سپس مصرف دارو را مطابق برنامه قبلی ادامه دهید. اما اگر تقریباً نزدیک به دوز بعد به یاد آوردید دوز فراموش شده را مصرف نکنید.

اگر برنامه مصرف دارو به صورت چند بار در روز است: هرچه سریعتر دوز فراموش شده را مصرف کنید سپس مصرف دارو را طبق برنامه قبلی ادامه دهید. اما اگر تقریباً نزدیک به دوز بعد به یاد آوردید دوز دارو را دو برابر کنید.

اگر دارو را بیش از حد معمول مصرف کردید:

بلافاصله با مرکز اطلاعات دارویی و سموم (DPIC) تماس بگیرید یا به بخش اورژانس نزدیک ترین بیمارستان مراجعه کنید.

آیا می دانید ۱۹۰ شماره تلفن مرکز اطلاعات دارویی و سموم تهران و اکثر شهرستان ها می باشد؟

بارداری و شیردهی:

بارداری: دسته بندی FDA برای مصرف این دارو در دوران بارداری C می باشد. به طور کلی توصیه می شود که در دوران بارداری از کمترین دوز موثر در کوتاه ترین زمان استفاده شود. از مصرف دوزهای بالا در سه ماهه اول بارداری خودداری کنید.

شیردهی: پردنیزولون در شیر مادر ترشح می شود. توصیه می شود در خانم های شیرده تا ۴ ساعت پس از مصرف دارو از شیردهی خودداری شود.

مصرف هم زمان با سایر داروها:

در صورت مصرف هرگونه داروی دیگر حتی داروهای گیاهی، ویتامین ها و مکمل های غذایی که با نسخه یا بدون نسخه مصرف می کنید، به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید بخصوص داروهای زیر:

مهارکننده های استیل کولین استراز، آمینوگلوتامید، آمفوتریسین بی، آندروژن ها، آنتی اسیدها، داروهای ضد دیابت، اشتها آورها، آریپیپرازول، واکسن ب ث ژ، کلسیتریول، سربیتینیب، کورتیکورلین، القا کننده ها و مهار کننده های آنزیم CYP3A4، دفرابروکس، دنورومب، اکیپاسه، مشتقات استروژنی، فوس اپریپانت، فلونوماید، متی مازول، میفیرستون، ناتالیزومب، عوامل مسدود کننده عصب - عضله، نیکوراندیل، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، پیمکرولیموس، پیموزاید، آنتی بیوتیک های دسته کینولونی، ریتوناویر، روفلومیلاست، سالیسیلات ها، تاکرولیموس (موضعی)، دیورتیک های تیازیدی، توفاسیتینیب، تراستوزومب، واکسن ها (فعال و غیر فعال)، وارفارین، داروهای ضد آریتمی و کلرپرومازین.

عوارض جانبی احتمالی مصرف نیزوپرد چه می باشد:

هر دارو به موازات اثر درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

سرگیجه، سسکه، پارگی میوکارد، بحران کلیوی اسکرودرمی، استفراغ، اسهال، اختلال چربی خون، لیپوماتوز، کاتابولیس پروتئین، کاهش دید یا تاری دید، تکرر ادرار، عطش، گیجی، هیجان، توهم، افسردگی ذهنی، تغییرات خلقی، بی قراری، درد یا سوزش شکم یا معده، آکنه، افزایش فشار خون، افزایش ریسک ابتلا به بیماری های عفونی.

آیا می دانید در صورت مشاهده هرگونه عارضه جانبی می توانید از پزشک یا داروساز خود بخواهید کارت زرد ADR را برای شما پر کند؟ (کارت زرد ADR در راستای ارتقای گزارش دهی عوارض دارویی تهیه شده است).

نیزوپرد چطور نگه داری می شود:

– دارو را دور از دید و دسترس کودکان قرار دهید.

– دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید.

– دارو را تا زمان مصرف در بسته بندی اصلی خود نگهداری نمایید.

– از نگهداری دارو در حمام، کنار سینک، پشت پنجره و نیز گذاشتن آن در خودرو خودداری نمایید.

– از مصرف دارو پس از تاریخ انقضای درج شده روی بسته بندی خودداری نمایید.

توصیف محصول:

شکل ظاهری نیزوپرد و نحوه عرضه آن چگونه است:

قرص نیزوپرد ۵۰ میلی گرم به صورت سفید رنگ، گرد و خط دار متقاطع است که در جعبه های ۱۰۰ عددی (حاوی ۱۰ بلیستر کارت ۱۰ عددی) همراه یک برگه راهنما عرضه می گردد.

قرص نیزوپرد ۵ میلی گرم به صورت صورتی رنگ، گرد و خط دار است که در بسته های ۱۰۰ عددی (حاوی ۱۰ بلیستر کارت ۱۰ عددی) همراه یک برگه راهنما عرضه می گردد.

تولید کننده:

نیزوپرد محصول شرکت داروسازی ایران هورمون می باشد.

کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، صندوق پستی ۱۳۱۸۵۱۷۶۷، تهران، ایران

تلفن صدای مشتری: ۹۰-۹۸۲۱۴۴۹۰۵۵۱۷ (داخلی ۳۵۸)



BRC/ P- SOI3- 01/ 02