

دیابت

دیابت یک بیماری مزمن شایع است که منجر به افزایش میزان قند خون (گلوکز) می شود. دیابت میتواند منجر به عوارض شدید شامل بیماری های قلبی ، بیماری های عروقی و اختلال در جریان خون اندام ها، کوری، نارسایی کلیه، تاخیر در ترمیم زخم ها، سکتة مغزی و سایر بیماری های سیستم عصبی شود.

Metgline 500
Metformin



شرکت داروسازی ایران هورمون
IRAN HORMONE PHARMACEUTICAL Co.

دیابت را نمیتوان بطور قطعی درمان کرد اما میتوان آن را با موفقیت تحت کنترل در آورد. عوارض ناشی از دیابت با کنترل دقیق قند خون و فشار خون بالا و میزان کلسترول پلاسما قابل پیشگیری هستند.

انواع دیابت:


- ۱- دیابت نوع یک که اغلب به آن دیابت جوانان یا دیابت وابسته به انسولین هم گفته می شود، زمانی ایجاد میشود که پانکراس انسولین کافی تولید نمیکند. دیابت نوع یک معمولاً در کودکی یا نوجوانی تشخیص داده میشود و نیاز به درمان با انسولین برای همه ی عمر دارد.
- ۲- دیابت نوع دو که به آن دیابت بالغین هم گفته می شود از دیابت نوع یک بسیار شایع تر است. با افزایش شیوع چاقی در کودکان و نوجوانان دیابت نوع دو در کودکان و نوجوانان نیز در حال فراگیر شدن است. به عبارت دیگر اپیدمی (همه گیری) دوگانه ی اضافه وزن / چاقی و دیابت نوع دو در حال وقوع است.

در دیابت نوع دو بدن انسولین ترشح می کند اما نمیتواند متابولیسم گلوکز را بدرستی انجام دهد. بنابراین مقاومت به انسولین نقش کلیدی در دیابت نوع دو دارد. با این حال بیماران با دیابت نوع دو هم کمبود انسولین دارند . اگرچه این کمبود به اندازه ی بیماران با دیابت نوع یک نیست.

فاکتورهای خطر:

- اضافه وزن فاکتور خطر مهم و البته کنترل ابتلا به دیابت نوع دو است. رسیدن به وزن مناسب و حفظ آن ممکن است تنها درمان مورد نیاز برای بسیاری از بیمارانی باشد که در ریسک ابتلا به دیابت نوع دو هستند.
- سابقه ی فامیلی دیابت نوع دو.

- فعالیت بدنی و اجتناب از مصرف غذاهای فرآوری شده و تغذیه با رژیم کم چرب و غنی از سبزیجات و غلات کامل ریسک ابتلا به دیابت نوع دو را کاهش می دهد.



علائم بیماری دیابت:

- علائم مشخصه ی دیابت عبارتند از : تشنگی شدید، خستگی، بروز عفونتهای مکرر، اختلال در خون رسانی به اندام ها (شامل بی حسی و سوزش در پاها یا دست ها) ، تاخیر در ترمیم زخم ها، تاری دید و کاهش وزن بدون برنامه ریزی.
- بسیاری از بیماران با دیابت نوع دو علامتی ندارند و بیماری آنها بعد از آزمایشات برای تشخیص سایر بیماری ها یا در طی غربالگری افراد در ریسک ابتلا به دیابت تشخیص داده میشود.

درمان ها :

- انسولین برای درمان دیابت نوع یک همیشه مورد نیاز است.
- تغذیه ی سالم، فعالیت بدنی روزانه، قطع سیگار و کنترل قند خون و غلظت هموگلوبین A1C (شاخصی برای کنترل طولانی مدت قند خون) مهمترین درمان برای دیابت نوع یک و نوع دو هستند.
- در دیابت نوع دو در صورتی که رژیم غذایی و فعالیت بدنی بعد از چند ماه منجر به کنترل قند خون نشود، داروهای خوراکی تجویز می شوند.



دارای گواهینامه ISO 9001: 2015

دارای گواهینامه اشتها به کیفیت

دومین دوره جایزه ملی کیفیت غذا دارو و بهداشت ایران

تهران: کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، صندوق پستی: ۱۷۶۷-۱۳۱۸۵

تلفن: ۴۴۹۰۵۵۱۷-۹ (۰۲۱) فکس: ۴۴۹۰۵۵۱۲ (۰۲۱)

صدای مشتری: (۳۵۸) ۴۴۹۰۵۵۱۷-۹ (۰۲۱)

توزیع و پخش در داروخانه های سراسر کشور توسط شرکت های:

پخش فردوس، داروگستر نخبگان، رازی، قاسم ایران، محیا دارو

www.iranhormone.com

info@iranhormone.com



- در صورتی که تغذیه ی سالم و فعالیت بدنی و داروهای خوراکی در کنترل قند خون موثر نباشند آنگاه انسولین هم به بیماران دیابت نوع دو تجویز می شود.

- National Diabetes Information Clearinghouse
- National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases
<http://www.niddk.nih.gov>
- American Diabetes Association
<http://www.diabetes.org>