

Vitamin B₁/B₆/B₁₂

Benourovit

Injectable Solution

ویتامین ب_۱ / ب_۶ / ب_{۱۲}

بنوروویت

معلول قابل تزریق

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری ننمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک مشورت نمایید:

– وجود هر نوع حساسیت به هر یک از اجزا، سازنده دارو و مواد دیگر از قبیل غذاها، مواد محافظ و رنگ ها.

– در صورت مصرف داروهایی مانند لوودوپا، فنی تونین، آمینو سالیسیلیک اسید، کلرامفنیکل، کلشی سین، نئومایسین، متوترکسات، اتاناکوئیسیت های گیرنده H₂، پیریمتامن و الکل.

– در صورت ابتلا به بیماری Leber (آتروفی ارثی عصب بینایی).

– حاملگی و شیردهی.

نکات قابل توصیه به هنگام مصرف دارو:

توجه: به علت وجود بنزیل الکل، این دارو نباید در نوزادان نارس یا رسیده بکار رود.

– توصیه می شود افرادی که دارای حساسیت به کباتل می باشند از مصرف این فرآورده خودداری ننمایند.

– در بیماران که به کم خونی مگالوبلاستیک شدید مبتلا هستند، تجویز مقادیر زیاد ویتامین ب_{۱۲} ممکن است به افت پتاسیم خون منجر شود.

لذا توصیه می شود طی ۴۸ ساعت اول درمان با ویتامین ب_{۱۲} سطح پتاسیم خون بیمار تحت بررسی قرار گیرد.

– از مصرف فولیک اسید به جای ویتامین ب_{۱۲} خودداری نمایید زیرا فولیک اسید ممکن است علائم مربوط به کم خونی را برطرف نماید اما از پیشرفت عوارض عصبی جلوگیری نمی کند.

– به علت ناسازگاری ویتامین ب_۱ موجود در فرآورده با محلول های بازی توصیه می شود از ترکیب آن با محلول هایی نظیر (کربنات ها، سیترات ها، باربیتورات ها، استات ها و یون های مس) خودداری نمایید.

محلول های حاوی سولفیت نیز با ویتامین ب_۱ ناسازگاری دارند.

– توصیه می شود بیمارانی که داروی لوودوپا مصرف می نمایند از مصرف اشکال دارویی حاوی ویتامین ب_۶ خودداری کنند.

– مصرف مقادیر زیاد ویتامین ب_۶ در دراز مدت می تواند ایجاد وابستگی نماید.

– استفاده از مقادیر زیاد ویتامین ب_۶ در دراز مدت باعث بروز نوروپاتی شدید محیطی می گردد.

هم چنین افت غلظت خونی اسید فولیک بعد از مصرف ویتامین ب_۶ مشاهده شده است.

– این دارو را به عنوان جایگزین برای رژیم غذایی متعادل استفاده نکنید.

مصرف در بارداری:

توصیه می گردد مصرف این دارو در دوران بارداری، با نظر پزشک معالج و با سنجیدن فواید و مضرات دارو صورت گیرد.

مصرف در شیردهی:

از آنجاییکه احتمال مهای ترشح شیر توسط ویتامین ب_۶ موجود در دارو، وجود دارد و هم چنین در ارتباط با ترشح ویتامین ب_۱ در شیر مادر اطلاعات کافی در دسترس نیست لذا توصیه می شود این دارو در دوران شیردهی با توصیه پزشک معالج مصرف گردد.

موارد مصرف:

این دارو در موارد کمبود ویتامین های ب_۱، ب_۶، ب_{۱۲} و یا افزایش نیاز بدن به این ویتامین ها به کار می رود، هم چنین به عنوان یک درمان حمایتی در نوروپاتی مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدار مصرف دارو توسط پزشک معالج تعیین می شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت کنید.

احساس گرما، خارش، کپهر، ضعف، تعریق، انسداد عروقی محیطی، تهوع، بی قراری، ادم ریوی، خونریزی گوارشی، اختلال در حس لمس، نارسایی قلبی، خواب آلودگی، گرفتگی گلو، اسهال گذرا و درد در محل تزریق.

احتمال بروز شوک آنافیلاکسی با فرآورده های تزریقی حاوی ویتامین ب_{۱۲} نیز وجود دارد.

شرایط نگهداری:

– دارو را در یخچال (در دمای بین ۸- تا ۲- درجه سانتی گراد)، درون جعبه، دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

– دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

تلفن صدای مشتری: ۱۶۰۱۷۱۹۰۵۵۱۴۴۹۰۵۵۸ داخلی ۳۵۸

شرکت داروسازی ایران هورمون
IRAN HORMONE PHARMACEUTICAL Co.

