

Vitamin B₁₂

ویتامین ب ۱۲

Bitavion 100 & 1000 mcg

بیتاویون ۱۰۰ و ۱۰۰۰ میکروگرم

Injectable Solution

محلول قابل تزریق

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

– وجود هر نوع حساسیت به ویتامین ب ۱۲، کباب، غذاها، مواد محافظ و رنگ ها.

– در صورت بارداری و شیردهی.

– در صورت مصرف داروهای زیر:

آمینوسالیسیلیک اسید، کلرامفنیکل، کلشی سین، متوترکسات، پیریمتاین و الکل.

– در صورت داشتن سابقه ابتلا به بیماری Leber (آتروفی ارثی عصب بینایی).

نکات قابل توصیه به هنگام مصرف دارو:

– این دارو را فقط طبق نظر پزشک مصرف ننمایید.

– از مصرف فولیک اسید به جای ویتامین ب ۱۲ خودداری نمایید.

فولیک اسید ممکن است کم‌خونی را برطرف نماید ولی از پیشرفت عوارض عصبی ناشی از کمبود ویتامین ب ۱۲ جلوگیری نمی‌کند.

موارد و مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف صحیح هر دارو را پزشک تعیین می‌کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:

– درمان آنمی پرنسیپوز (سو، جذب ویتامین ب ۱۲)

بزرگسالان:

۱۰۰ میکروگرم به مدت ۶ تا ۷ روز به صورت تزریق عمیق زیر جلدی یا عضلانی تجویز می‌شود.

به دنبال آن در صورتی که بهبود بالینی و پاسخ ریتیکولوسیت پدید آید مقدار ۱۰۰

میکروگرم یک روز در میان برای ۷ نوبت و سپس هر ۳ تا ۴ روز یک بار به مدت ۳-۲ هفته تزریق عمیق زیر جلدی یا عضلانی صورت می‌گیرد.

مصرف نگهدارنده این ویتامین یک بار در هر ماه به میزان ۱۰۰ میکروگرم می‌باشد.

– درمان کمبود ویتامین ب ۱۲:

بزرگسالان:

۳۰ میکروگرم در روز به مدت ۵ تا ۱۰ روز به صورت عضلانی و یا زیر جلدی عمیق تزریق می‌گردد که دوز نگهدارنده آن ۱۰۰ الی ۲۰۰ میکروگرم در ماه می‌باشد.

اطفال:

برای درمان علائم خونی ۱۰ الی ۵۰ میکروگرم در روز به مدت ۵ تا ۱۰ روز و سپس ۱۰۰

الی ۲۵۰ میکروگرم هر ۲ تا ۴ هفته تزریق می‌شود.

در صورت وجود علائم عصبی ۱۰۰ میکروگرم در روز به مدت ۱۰ تا ۱۵ روز و سپس ۱

یا ۲ بار در هفته به مدت چند ماه تجویز می‌شود و می‌توان ۲۵۰ الی ۱۰۰۰ میکروگرم

را ماهانه به مدت ۱ سال تزریق نمود.

مصرف در بارداری:

با مصرف مقدار مورد نیاز روزانه این ویتامین در دوران بارداری (۲/۲ میکروگرم در روز) عوارضی در انسان مشاهده نشده است.

جهت مصرف مقادیر بالاتر از نیاز روزانه در این دوران با پزشک معالج مشورت گردد.

مصرف در شیردهی:

این ویتامین با غلظتی تقریباً هم سطح غلظت خونی آن در شیر ترشح می‌شود.

میزان ویتامین ب ۱۲ مورد نیاز در دوران شیردهی ۲/۶ میکروگرم در روز می‌باشد.

لذا جهت مصرف مقادیر بالاتر از نیاز روزانه در این دوران با پزشک معالج مشورت گردد.

عوارض جانبی:

هر دارویی به موازات اثرات درمانی دارای برخی عوارض ناخواسته می‌باشد، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود ولیکن در صورت بروز هر یک از عوارض

زیر با پزشک خود مشورت کنید:

بثورات پوستی، خارش، ادم ریوی، نارسایی احقانی قلب، ترومبوز عروقی محیطی، شوک آنافیلاکتیک، اسهال گذرا و درد در محل تزریق.

درمان با ویتامین ب ۱۲ ممکن است علائم پلی سیمی ورای مخفی را آشکار سازد.

شرایط نگهداری:

– دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری ننمایید.

– دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت ننمایید.

– از نگهداری و مصرف داروی تاریخ مصرف گذشته خودداری کنید.

تلفن صدای مشتری: ۰۱۹-۱۷۵۵۱۴۴۹۰ داخلی ۳۵۸



شرکت داروسازی ایران هورمون
IRAN HORMONE PHARMACEUTICAL Co.