

Caberlin 0.5

Cabergoline
Scored Tablet

کابرلین ۰/۵

کابرگولین

قرص خط دار

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری ننمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک مشورت نمایید:

- وجود هر نوع حساسیت به دارو، غذاها، مواد محافظ، رنگ‌ها و مشتقات ارگوت.
- در صورت ابتلا به پرفشاری خون کنترل نشده، اختلالات کبدی، اکلامپسی و پره اکلامپسی و سابقه آن.
- در صورت مصرف سایر داروها به خصوص مصرف هر یک از داروهای ضد فشار خون، فنوتیازین‌ها (پرفنازین، تری فلونوپرازین، کلرپرومازین)، تیوکراتین‌ها، هالوپریدول، متوکلوپرامید و تیوفیلین، موارد را به پزشک معالج خود اطلاع دهید.

نکات قابل توصیه به هنگام مصرف دارو:

- بطور کلی آکوتنیست‌های دوپامین نباید در کسانی که دچار فشار خون بالا در حین حاملگی هستند استفاده شوند مگر اینکه پزشک تشخیص دهد که مزایای دارو از مضرات آن بیشتر است.
- چنانچه در حین مصرف این دارو احتمال بارداری وجود داشته باشد و یا تصمیم به بارداری داشته باشید حتماً پزشک خود را مطلع نمایید.
- الکل باعث بروز شدیدتر عوارض جانبی این دارو می‌شود. در حین درمان با کابرلین از مصرف الکل خودداری نمایید.
- از کارهایی که احتیاج به هوشیاری کامل دارند مانند رانندگی اجتناب کنید.
- برای پیشگیری از بروز سرگیجه هنگام بلند شدن از حالت نشسته یا دراز کشیده، آهسته تغییر وضعیت دهید.

مصرف در بارداری:

این دارو در بارداری در رده B قرار دارد. اما از آنجایی که اطلاعات کامل در ارتباط با اثر دارو بر روی جنین انسان در دسترس نیست توصیه می‌شود تنها در صورت لزوم در دوران بارداری مصرف شود.

مصرف در شیردهی:

از آنجایی‌که دارو سبب کاهش و مهار ترشح شیر می‌گردد، لذا در زانی که قصد

شیردهی دارند نباید مصرف شود.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند. مقدار مصرف معمول این دارو

به قرار زیر است:

درمان اختلالات ناشی از هایپرپرولاکتینمی: شروع درمان با مقدار ۰/۲۵ میلی گرم دو بار در هفته به صورت خوراکی است که در صورت نیاز در فواصل ۴ هفته‌ای مقدار ۰/۲۵ میلی گرم ۲ بار در هفته به مقدار قبلی اضافه می‌شود. حداکثر مقدار دارو ۲ میلی گرم در هفته است (۱ میلی گرم ۲ بار در هفته).

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود اما در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید:

ضعف و خستگی مفرط، تهوع، استفراغ، یبوست یا اسهال، سردرد، سرگیجه، خواب رفتن دست‌ها و پاها، تغییر حالت روانی، اختلال در تمرکز، تورم دست/پا / قوزک پا، درد سینه، اختلالات قاعدگی، اختلال دید، دردهای شکمی، کاهش اشتها، افت ناگهانی فشار خون در اثر تغییر وضعیت از نشسته یا خوابیده به حالت ایستاده، سو، هاضمه، خشکی دهان، نفخ، علائم شبه آتفلوآنزا، گرگرفتگی، اختلال در خواب، افسردگی، درد عضله و مفاصل، خارش، درد دندان، آبریزش بینی، آکنه، افزایش میل جنسی، تپش قلب و اضطراب.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.
- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

تلفن صدای مشتری: ۰۱۹-۵۵۱۷-۴۴۹۰۵ داخلی ۳۵۸

شرکت داروسازی ایران هورمون

IRAN HORMONE PHARMACEUTICAL Co.

