

تستوسترون انانتات ۱۰۰ و ۲۵۰ Testosterone Enanthate 100 & 250

آندوزیکس-آی اچ

Injectable Solution

محلول قابل تزریق

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا در درمان موارد مشابه و یا توصیه به دیگران جداً خودداری نمایید. قبل از مصرف این دارو، وجود هر یک از موارد زیر را به پزشک خود اطلاع دهید:

– سابقه حساسیت به این دارو و یا سایر پروستا، مواد جانبی داروها، غذاها و رنگ ها.
– ابتلا به سرطان پروستات و هایپرپلازی پروستات، سرطان پستان مردان، اختلالات کلیوی، ناراسایی قلبی و سابقه انفراکتوس میوکارد.

– ابتلا به تومورهای کبدی و یا سابقه قبلی آن.

– در صورت مصرف سایر داروها به خصوص ضد انعقادها و داروهای هیپوتنوسیک به پزشک خود اطلاع دهید.

موارد منع مصرف:

– بارداری

– مردان مبتلا به سرطان پروستات و پستان

– استفاده از هورمون مردانه تستوسترون برای افزایش حجم عضلات و افزایش کارایی فیزیکی، در افراد سالم اکیداً ممنوع بوده و می تواند پیامدهای خطرناک و غیرقابل جبرانی در پی داشته باشد.

مصرف در بارداری:

– مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع است.

مصرف در شیردهی:

– از آنجایی که در ارتباط با ورود آندروژن ها به شیر مادر اطلاعات دقیق در دسترس نیست، لذا مصرف دارو در دوران شیردهی توصیه نمی گردد و در صورت لزوم مصرف دارو، شیردهی می بایست متوقف شود.

احتیاط مصرف:

– استفاده طولانی مدت از این دارو ممکن است سبب بروز اختلالات افزایشی در تعداد گلبول های قرمز خون شود. بنابراین در طی درمان با این دارو انجام آزمایشات خون توصیه می شود.

– این دارو می تواند سرعت رشد تومورهای پروستات موجود را افزایش داده و سبب هایپرپلازی پروستات به خصوص در سالمندان شود. به همین جهت توصیه می شود قبل از شروع درمان، تست های پروستات توسط پزشک انجام شده و در حین درمان نیز سلامت پروستات بیمار کنترل شود.

– مصرف طولانی مدت با دوز بالای این دارو سبب مشکلات شدید مانند تومور کبدی، هیپاتیت کلسیتیک و زردی می گردد.

– قبل از تجویز دارو در پسران به منظور درمان بلوغ دیررس، در ارتباط با عارضه جانبی دارو بر روی بلوغ استخوانی با والدین بیمار مذاکره نمایید و همچنین پایش بلوغ استخوان از طریق تعیین سن استخوان دست و مچ دست بیمار مذکره نمایید

– در بیماران مبتلا به سرطان پستان، درمان با آندروژن سبب افزایش سطح کلسیم از طریق تحریک لیز استخوانی می گردد که در این صورت می بایست دارو قطع شده و پایش سطح کلسیم احراز و خون به طور مرتب انجام شود.

– ورم به علت احتیاس آب و سدیم پس از مصرف، یکی از شکایات اصلی بیمارانی است که سابقه ابتلا به بیماری های کبدی، کلیوی و قلبی را دارند که در این افراد می بایست علاوه بر قطع دارو، درمان با دیورتیک ها نیز انجام شود.

– توصیه می شود بررسی دوره ای عملکرد کبد و اندازه گیری سطح آرتی اخصامی پروستات، کلسترول و HDL و چربی درمان با دارو انجام شود.

– در بیماران مبتلا به دیابت، تستوسترون سبب تغییر در سطح گلوکز خون می گردد. لذا تنظیم مقدار

مصرف انسولین مورد نیاز می باشد.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف دارو را پزشک تعیین می کند. مقدار مصرف این دارو و طول درمان به سن، جنس، نوع بیماری، پاسخ درمانی بیمار و عوارض جانبی بروز یافته بستگی دارد. به طور معمول استفاده از مقدار بالاتر از ۴۰۰ میلی گرم در یک ماه، به دلیل طولانی اثر بودن دارو و ماندگاری آن در بدن توصیه نمی شود.

قبل از تزریق، آمپول را به آرامی بین کف دو دست چرخانده و گرم نمایید تا کریستال های تشکیل شده در اثر نگهداری در دمای پایین حل شود و سپس به صورت عضلانی عمیق و آهسته در عضله تشکیل شده تزریق نمایید.

– از تزریق رویدی دارو خودداری نمایید.

– استفاده از سر سوزن و سرنگ مربوط سبب کدر شدن محصول روغنی می گردد که البته تغییری در اثر بخشی دارو ایجاد نمی کند.

مقدار مصرف معمول دارو به شرح زیر است:

– در هورمون تراپی مردانه: ۵۰ تا ۴۰۰ میلی گرم هر ۲ تا ۴ هفته یک بار
– در کودکان: جهت بلوغ دیررس پسران: ۵۰ تا ۲۰۰ میلی گرم هر ۲ تا ۴ هفته یک بار و برای دوره محدود (۴ تا ۶ ماه)

– در سرطان پستان متاستاتیک زنان: ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلی گرم هر ۲ تا ۴ هفته یک بار تزریق می شود و بیمار به طور مرتب پایش می شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز عوارض زیر با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید.

نکته: تجارب نشان داده است علایمی مانند تحریک سرفه و سختی تنفس در صورت تزریق سریع فراورده های روغنی بیشتر دیده می شوند.

عوارضی که نیاز به توجه بیشتری دارد و باید سریعاً به پزشک خود اطلاع دهید:

آمنوره و قاعدگی نامنظم، آکنه، کاهش سایز پستان، بزرگ شدن آلت تناسلی، خشونت و گرفتگی صدا، الگوهای طاسی موی مردانه، پوست چرب و افزایش رویش مو در صورت و بدن در زنان، عفونت ادراری، تکرر ادرار، بزرگ شدن سایز پستان، ارفش (راست شدن) ناخواسته، دردناک و طولانی مدت آلت تناسلی و کاهش تعداد اسپرم در مایع منی در مردان شایع است.

سایر عوارض جانبی:

افزایش یا کاهش تمایلات جنسی، احتیاس مایعات در بدن مانند تورم در پاها و زانو، استرس و اضطراب، افسردگی، سردرد، مورمور شدن، ضعف و خستگی، زرد شدن پوست و چشم ناشی از اختلالات کبدی، مشکلات گوارشی (تهوع و استفراغ)، افزایش کلسترول خون و مهار فاکتورهای انعقادی (خونریزی غیر طبیعی)، التهاب و درد در محل تزریق و واکنش های آتافیلیکسی، خونریزی گوارشی و هایپرپلازی خوش-خیم پروستات در مردان می باشد. در صورت بروز عوارض دیگر می توانید با پزشک و یا داروساز خود تماس بگیرید.

شرایط نگهداری:

– دارو را دور از نور، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

– دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

تلفن صدای مشتری: ۱۷۰۹۵۵۱۴۹۰ داخلی ۳۵۸

شرکت داروسازی ایران هورمون
IRAN HORMONE PHARMACEUTICAL Co.

