

## آندروستین ۵۰

Androstin 50

سیپروترون استات

Cyproterone Acetate

قرص خط دار

Scored Tablet

راه‌نمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری‌های قلبی-شما تجویز گردیده است لذا از مصرف آن درموارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران حتی در صورتی که علایم شبیه به شما دارند خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

وجود حساسیت به سیپروترون استات یا سایر اجزا، فرمولاسیون، دارو و مواد دیگر از قبیل غذاها، مواد محافظ و رنگ ها  
در صورت ابتلا به هر بیماری به ویژه: ابتلا یا سابقه ابتلا به مننژیوما، سابقه مشکلات عروقی مغزی، سندرم دویبن-جانسون، سندرم رتور، ابتلا یا سابقه ابتلا به اختلالات ترموآمبولیک(مانند ترومبوز ورید عمقی، سابقه سکت قلبی، سابقه آمبولی ریوی)، بیماری‌ها و ناراحتی‌های، ابتلا یا سابقه ابتلا به تومورهای بیضه، بیماری‌های بدخیم، افسردگی مزمن شدید، دیابت، کم‌خونی داسی شکل، سرطان پروستات، اعتیاد مزمن به الکل، اختلال کبدی، دیابت شدید همراه با تغییرات عروقی، مشکلات روانی عدم تحمل گالاکتوز، فقدان یا کمبود لاکتاز آپ یا سو، جذب کلکژن- گالاکتوز

در صورت مصرف هر گونه داروی دیگر حتی داروهای گیاهی، ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی که با نسخه یا بدون نسخه مصرف می‌کنید، به ویژه داروهای ضد دیابت خوراکی و انسولین و بارداري و شیردهي

**استفاده از این دارو در اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال توصیه نمی‌شود.**

**نکات قابل توجه هنگام مصرف:**

دارو را بعد از غذا مصرف نمایید.  
خستگی و ضعف از عوارض معمول این دارو به خصوص در چند هفته اول مصرف می‌باشد. هنگام ازدیادگی یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری دارند احتیاج کنید.

در موارد اعتیاد مزمن به الکل پاسخ درمانی به این دارو مشاهده نمی‌شود.

طی مصرف این دارو از نوشیدن الکل اجتناب نمایید.

این دارو ممکن است بوی استخوانی و تکرار بیضه را به تأخیر بیندازد بنابراین نباید برای جوانان نابالغ تجویز شود.

عملکرد کبدی پیش از شروع درمان، بطور منظم طی درمان و یا هر زمان که علایم سمیت کبدی پیش از دهد باید ارزیابی شود و در صورت بروز سمیت کبدی ناشی از سیپروترون درمان باید قطع شود (مگر آنکه علت بروز آن عامل دیگری (مانند بیماری‌های مستعاض شده) باشد که در دو ماه مصرف دارو به رفع بیمار باشد).  
در مردان مبتلا به سرطان پروستات ممکن است محدود کردن دوره درمان توصیه شود.

از آتجایی که کم‌خونی از عوارض جانبی این دارو می‌باشد لذا اندازه گیری سلول‌های خونی پیش از شروع و طی درمان توصیه می‌شود.

به علت گزارش‌های مهار آندروکتونیکال، می‌درمان یا این دارو، عملکرد آندروکتونیکال باید بطور منظم ارزیابی شود.

مردان مبتلا به دیابت نیاز به پایش دقیق و کنترل دیابت دارند.

کلیرانس کبدی سیپروترون با افزایش سن کاهش می‌یابد.

در صورت مصرف مقدار بیش از حد تجویز شده، با مرکز اطلاعات دارویی و سموم (TIPS) تماس بگیرید یا به بخش اورژانس نزدیکترین بیمارستان مراجعه کنید (حتی در صورت عدم وجود علائم).

در صورت تجویز این دارو با دوز بالا به زنان، تمام موارد گفته شده برای زنان نیز صدق می‌کند.

**موارد و مقدار مصرف:**

کنترل میل جنسی در اختراق یا بیش فعالی جنسی در مردان: ۵۰ میلی گرم (یک قرص) دو بار در روز

(پیشگیری از عود تومور همراه درمان ابتدایی آنالوگ گنادورلین:

مردان بزرگسال: روزانه ۲۰۰ میلی گرم در ۲ تا ۳ دوز منقسم به مدت ۷ تا ۱۰ روز قبل از آغاز آنالوگ گنادورلین، سپس روزانه ۲۰۰ میلی گرم در ۲ تا ۳ دوز منقسم به مدت ۴ تا ۶ هفته بعد از آغاز آنالوگ گنادورلین. حداکثر دوز روزانه ۳۰۰ میلی گرم می‌باشد.

درمان تستیکولی ممتد کارسینوما پروستات، زمانی که آنالوگ‌های گنادورلین تحمل نمی‌شود و یا جراحی تخلیه یک یا هر دو بیضه منع مصرف دارد، از زمانی که درمان خوراکی ترجیح دارد:

مردان بزرگسال: ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلی گرم روزانه در ۲ تا ۳ دوز منقسم  
درمان گرگرفتگی همراه درمان آنالوگ گنادورلین یا بعد از جراحی تخلیه یک یا هر دو بیضه:

مردان بزرگسال: ابتدا ۵۰ میلی گرم روزانه سپس ممکن است دوز روزانه بر اساس پاسخ بیمار تا ۱۵۰ میلی گرم افزایش یابد. (۵۰ تا ۱۵۰ میلی گرم در ۱ تا ۳ دوز منقسم)

**\* حداکثر دوز روزانه این دارو ۳۰۰ میلی گرم می‌باشد.**

**عوارض جانبی:**

همه دارو به موازات اثر درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، ولی در صورت بروز هر عارضه‌ای به ویژه عوارض زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید. کاهش میل جنسی (برگشت پذیر)، مهار بازگشت پذیر تولید اسپرم، کاهش حجم ازال (برگشت پذیر)، حالت افسردگی و تغییر نفس، تنگی نفس، خستگی و ضعف، بزرگی پستان و غدد پستانی، اختلالات کبدی، سمیت کبدی شامل برفان، هیپاتیت و ناراحتی کبدی، گرگرفتگی، افزایش تعریق، درد شکم پستانی، بی قراری، تغییر وزن، واکنش‌های پوستی، تولید ناچای شیر و تولیدوهای خوش خیم، نپوئاسمی‌ها، مهار آندروکتونیکال، کم‌خونی، آروسمی، تغییرات مو، هایپوتیروکوزیز (کاهش یا توقف رشد موی سر)، استئوپوروز (پوکی استخوان)، کم‌فانیی غدد سباسه (اختلال بروز آکنه)، ترموآمبولی، نابروری (برگشت پذیر)، مننژیوما مصرف در بارداری و شیردهی:

این دارو برای استفاده در زنان نمی‌باشد و مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی منع است.

**شرایط نگهداری دارو:**

دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

تلفن صدای مشتری: ۹-۱۷۰۵۵۵۴۴۹ داخلی ۳۵۸

شرکت داروسازی ایران هورمون

IRAN HORMONE PHARMACEUTICAL CO.

