

بتامتازون بتازونکس

۴ میلی گرم در ۱ میلی لیتر
محلول قابل تزریق

Betamethasone

Betasonex

4 mg/ 1mg
Injectable Solution

را هتمایمی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

– این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری ننمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

– وجود نوع حساسیت به کورتیکوئوربین یا آدرنوئیکوئیندها و مواد دیگر از قبیل غذا، مواد محافظ و رنگ ها.

– در صورت ابتلا به بیماریهایی نظیر ایدز، عفونت‌های قارچی سیستمیک، اختلالات دستگاه گوارش، بیماری‌های قلبی، نارسایی احتقانی قلب، بیماری‌های کلیوی، دیابت، میاستنی گراویس و استئوپروز.

– در صورت حاملگی و شیردهی.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:

– بدون اطلاع پزشک از مصرف هم زمان این دارو با داروهایی نظیر آنتی اسیدها، فرم تزریقی آمفوتریسین ب، داروهای خوراکی ضد دیابت، گلیکوزیدهای دیورتال، دیورتیک ها، داروهای الفا کندنده آتزیم کیدی، منابع پتاسیم، داروهای حاوی سدیم، هورمون رشد انسانی، واکسن ها و فرآورده های حاوی الکترولیت خودداری کنید.

– در درمان دراز مدت ممکن است محدودیت مصرف سدیم، کالری و افزایش مصرف مکمل پتاسیم و پروتئین بیشتر مورد نیاز باشد.

– از مصرف بیش از مقدار و مدت توصیه شده توسط پزشک خودداری ننمایید.

– معاینات چشم پزشکی در طول درمان دراز مدت به طور مرتب باید انجام شوند.

– پیش از قطع مصرف دارو به پزشک مراجعه کنید زیرا ممکن است قطع تدریجی مصرف دارو لازم باشد.

– در صورت بروز عفونت ها یا شایعات جدی باید احتیاط کرد.

– چنانچه در حین مصرف این دارو با افرادی که دچار سرخ یا آبله مرغان هستند مجاور شوید ممکن است اقدامات پیشگیرانه لازم باشد.

– این دارو ممکن است باعث اختلال در هوشیاری شود بنابراین در رانندگی یا کار با ماشین آلات می بایست احتیاطات لازم را رعایت کرد.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند اما مقدار دوزاژ معمول این دارو به قرار زیر می باشد:

در بزرگسالان: تا میزان ۹ میلی‌گرم بتامتازون در روز داخل فمعل، ضایعه و بافت نرم تزریق می‌گردد. از راه عضلانی، آهسته وریدی و انفوزیون وریدی نیز ۲۰-۴ میلی گرم تجویز می گردد که ۲۴ ساعت می توان این مقدار را حداکثر ۴ مرتبه تکرار نمود.

در کودکان: دوز این دارو در کودکان بر اساس وزن و سطح بدن آنها طبق نظر پزشک محاسبه می‌گردد. مصرف در بارداری:

مصرف این دارو در دوران بارداری توصیه نمی‌گردد. هر چند که مطالعات جامعی در مورد این دارو در انسان صورت نگرفته است.

در هر صورت مصرف طولانی مدت این دارو در دوران بارداری ممکن است مشکلاتی را برای نوزاد پس از تولد به وجود آورد.

مصرف در شیردهی:

کورتیکواستروئیدها از شیر مادر عبور می کنند و ممکن است اثرات نامطلوبی بر روی رشد نوزاد داشته و یا باعث یک سری عوارض ناخواسته در نوزاد گردند که بستگی به مقدار داروی مصرفی در روز دارد. در این صورت ممکن است لازم باشد از داروهای دیگر استفاده گردد و یا شیردهی متوقف گردد که تشخیص این مسئله به عهده پزشک معالج می باشد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت شود:

کاهش یا افزایش اشتها، سوزش دهان، عصبانیت، بی قراری، اشکال در به خواب رفتن، سرگیجه، برافروختگی، سردرد، افزایش درد مفاصل، افزایش تعریق، منگی، افزایش غیر طبیعی رشد موی بدن و صورت، درد شکم و معده، آکنه، مدفوع خون آلود، ضربان نامنظم قلب، اختلالات قاعدگی، خستگی و ضعف غیر معمول، استفراغ، اختلال یا کاهش دید و تکرر ادرار، دیابت، سوزش و عفونت در محل محل تزریق، نارسایی احتقانی قلب، واکنش های آلرژیک، آتافیلاکسی، اختلالات رفتاری، صرع، اختلالات بینایی، احتباس آب و نمک، افزایش فشار خون، پوکی استخوان، پانکراتیت، افزایش وزن، تغییر رنگ پوست، خونریزی از بینی، نکروز آواسکولار استخوان، اختلالات گوارشی، مهار رشد در کودکان و سندرم کوشینگ.

شرایط نگهداری:

– دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری ننمایید.

– دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت ننمایید.

– از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری ننمایید.

تلفن صدای مشتری: ۰۱۹-۵۵۱۷۴۴۹ داخلی ۳۵۸

شرکت داروسازی ایران هورمون
IRAN HORMONE PHARMACEUTICAL Co.

