

Betasonex 0.5

Betamethasone

Scored Tablet

بتازونگس ۰/۵

بتامتازون

قرص خط دار

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

– این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

– وجود هر نوع حساسیت به کورتیکواستروئیدها و مواد دیگر از قبیل غذا، مواد محافظ و رنگ ها.

– در صورت ابتلا به بیماری هایی نظیر ایدز، عفونت های موضعی یا سیستمیک، اختلالات دستگاه گوارش، بیماری های قلبی، میاستنی گراویس، اختلالات مربوط به غده تیروئید، بیماری های کبدی و بالا بودن کلسترول خون.

– در صورت حاملگی و شیردهی.

– در صورت مصرف داروهایی مانند آمینوگلوکوتنماید، آمفوتریسین B تزریقی، آنتی اسیدها، ضد دیابت های خوراکی، گلیکوزیدهای دیژیتال، دیورتیک ها، کتونکوزال، مکمل های پتاسیم، واکسن ها و آنتی بیوتیک های ماکرولیدی.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:

– به منظور عدم ناسازگاری دارویی در مورد مصرف هر نوع داروی نسخه ای و بدون نسخه با پزشک معالج خود مشورت نمایید.

– در درمان دراز مدت ممکن است محدودیت مصرف سدیم، کالری و افزایش مصرف مکمل پتاسیم و پروتئین مورد نیاز باشد.

– در طول درمان با این دارو مرتب به پزشک مراجعه کنید.

– از مصرف بیش از مقدار و مدت توصیه شده توسط پزشک خودداری نمایید.

– در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به ترتیب زیر عمل نمایید:

در صورت مصرف یک روز در میان دارو، اگر صبح همان روز به یاد آوردید، دارو را مصرف کنید در غیر این صورت تا صبح روز بعد دارو را مصرف نکنید بنابراین یک روز مصرف دارو حذف می شود.

اگر دارو را یک بار در روز مصرف می کنید به محض به یاد آوردن آن از مصرف کینید ولی اگر زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است، دوز مربوط به همان نوبت را مصرف کرده و مقدار مصرف را دو برابر نکنید.

اگر دارو چند بار در روز تجویز شده است، هرچه زودتر آن را مصرف کنید و اگر زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است آن را دو برابر

مصرف ننمایید.

مصرف در بارداری:

مصرف این دارو در دوران بارداری توصیه نمی گردد. هرچند که مطالعات جامعی در مورد این دارو در انسان صورت نگرفته است.

در هر صورت مصرف طولانی مدت این دارو در دوران بارداری ممکن است مشکلاتی را برای نوزاد پس از تولد به وجود آورد.

مصرف در شیردهی:

کورتیکواستروئیدها از شیر مادر عبور می کنند و ممکن است اثرات نامطلوبی بر روی رشد نوزاد داشته و یا باعث یک سری عوارض ناخواسته در نوزاد گردند که بستگی به مقدار داروی مصرفی در روز دارد. در این صورت ممکن است لازم باشد از داروهای دیگر استفاده گردد و یا شیردهی متوقف گردد که تشخیص این مسئله به عهده پزشک معالج می باشد.

مقدار مصرف دارو:

بزرگسالان: به میزان ۷/۷-۰/۶ میلی گرم به صورت تک دوز و یا متقسم در روز مصرف می شود.

کودکان: میزان مصرف به وزن و یا سطح بدن کودک بستگی دارد که توسط پزشک معالج تعیین می گردد.

عوارض جانبی:

هردارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت شود: افزایش اشتها، سوهامه، عصبانیت یا بی قراری، اشکال در به خواب رفتن، تیره یا کمرنگ شدن پوست، سرگیجه، سردرد و افزایش غیر طبیعی رشد موی بدن و صورت از جمله عوارض این دارو می باشند. عوارض مصرف بیش از حد دارو به صورت تغییرات شبه کوشینگ شامل گردشمن صورت، چاقی، پرمونی، آکنه، اکیموز (پثورات قرمز رنگ)، درد معده، افزایش فشار خون، اختلال در فعالیت جنسی، دیابت، افزایش چربی خون مشاهده می گردد.

شرایط نگهداری:

– دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

– دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

تلفن مددای مشتری: ۰۱۹-۰۵۵۱۷۴۴۹ داخلی ۳۵۸

شرکت داروسازی ایران هورمون
IRAN HORMONE PHARMACEUTICAL Co.

