

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو بر حسب نیاز فعلی شما تجویز گردیده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

در صورت داشتن سابقه حساسیت به بیگالوتامید، هر کدام از داروهای دسته آنتی آندروژن غیر استروئیدی، غذاها، رنگ ها و مواد محافظ.

در صورت مصرف داروهایی مانند ضد انعقادها و مشتقات کومارین (وارفارین)، میدازولام، بوسوتینیب، ایبروتینیب، ایوبارادین، لومیتاپید، پیموزاید، سپمرویر، آوانافیل، بوستان، بودزوناید، کلشی سین، دوفتیلید، دوکسوروبیسین، اپلر تون، اورولیموس، فتانیل، هالوفاترین، ایماتینیب، ایواکافتور، لوراسیدون، پیمکرولیموس، اکسی کدون، پروپافنون، رانولازین، سالمترول، ساکساگلپیتین، تولوپانتان، بولی پریستال، ویلازودون، آنتاگونیست ویتامین K، زوکلوپیتیکسول، ایفسقامید.

در صورت وجود اختلالات خونی، بیماری های کبدی.

نکات قابل توصیه به هنگام مصرف دارو:

– دارو را مطابق دستور پزشک مصرف کنید و از قطع مصرف و یا تغییر مقدار دارو بدون مشورت با پزشک، پرهیزید. در صورتی که مصرف این دارو یک بار در روز است بهتر است این دارو در یک زمان مشخص در طول شبانه روز استفاده شود.

– این دارو می تواند همراه با غذا و یا با معده خالی مصرف نمود.

– در صورت بروز استفراغ به فاصله کوتاهی از مصرف دارو به پزشک خود اطلاع دهید.

– مصرف این دارو به ندرت موجب مشکلات کبدی در طول درمان می شود. – در صورت بروز علائمی مانند درد، حساسیت به لمس در قسمت بالا و راست شکم، زرد شدن رنگ پوست و یا چشم، خارش، تیره شدن رنگ ادرار به سرعت به پزشک خود اطلاع دهید.

– عوارضی مانند کاهش اشتها، تهوع، استفراغ، سردرد، درد عضلانی و مفاصل، خستگی ممکن است در طول درمان با این دارو ایجاد شود در صورت بروز دو و یا تعداد بیشتری از این علائم به صورت همزمان و ادامه این علائم بیشتر از چند روز به پزشک خود اطلاع دهید.

– مصرف این دارو ممکن است موجب خواب آلودگی شود در صورت بروز این عارضه، در هنگام رانندگی و یا کار با ماشین آلانی که نیاز به هوشیاری دارند احتیاط کنید.

از آنجایی که مواردی از افزایش قندخون در طول درمان با LHRH آگونیست ها در بیماران با سابقه قلی دیابت گزارش شده است لذا پیش قند خون در بیماران دریافت کننده بیگالوتامید به همراه LHRH آگونیست ها می بایست صورت گیرد.

موارد و مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:

سرطان پروستات

بزرگسالان: ۵۰ میلی گرم یک بار در روز (صبح یا شب)، درمان با این دارو می بایست به صورت همزمان با یک آنالوگ LHRH صورت گیرد.

مصرف این دارو در بیماران دچار اختلالات شدید تا متوسط کبدی می بایست

با احتیاط صورت گیرد.

در بیماران دچار اختلالات کلیوی و یا اختلالات کبدی خفیف نیاز به تنظیم دوز نمی باشد.

در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید ولی اگر زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد فقط آن نوبت را مصرف نموده و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.

مصرف در دوران بارداری:

استفاده از بیگالوتامید در خانم های باردار منع مصرف دارد و ممکن است رشد جنین را تحت تاثیر قرار دهد.

مصرف در دوران شیردهی:

استفاده از این دارو در دوران شیردهی ممنوع است.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر یک از این عوارض با پزشک مشورت نمایید.

عوارض جانبی شایع:

تهوع، اسهال، گرگرفتگی، ادرار خونی، افزایش آنزیم آمینوترانسفراز، ژینکوماستی، درد پستان، پنومونی.

عوارض جانبی با شیوع کمتر:

نئوپلاسم، درد گردن، تب، لرز، سپسیس، فتق، کیست، آتژین پکتوریس، نارسایی احتقانی قلب، انفارکتوس قلبی، ایست قلبی، اختلالات عروقی کرونر، سنکوپ، مدفوع قیری رنگ، خونریزی مقعدی، خشکی دهان، اختلال در بلع، آبسه لثه، سرطان دستگاه گوارش، ادم، افزایش اوره و کراتینین، از دست دادن آب بدن، نفرس، افزایش کلسترول، درد، کرامپ پا، افزایش تونیسیتی، گیجی، خواب آلودگی، کاهش میل جنسی، نوروپاتی، عصبانیت، اختلالات ریه، آسم، خونریزی از بینی، سینوزیت، خشکی پوست، آلوپسی، خارش، زونا، سرطان پوست، اختلالات پوستی، آب مروارید، ادرار دردناک، تکرر ادرار، هیدرونفروز، اختلالات مجاری ادراری.

عوارض جانبی نادر:

واکنش های حساسیتی مانند ادم آنژیونوروتیک و کهیر، بیماری بینابینی ریه شامل پنومونی بینابینی و فیبروز ریوی، کاهش تحمل گلوکز که به صورت دیابت و یا کاهش کنترل قند در افراد دارای سابقه دیابت بروز می کند.

شرایط نگهداری:

– دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.

– دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

– از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

