

کابرلین ۱

کابرگولین
قرص خط دار

Caberlin 1

Cabergoline
Scored Tablet

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک مشورت نمایید:

- وجود هر نوع حساسیت به دارو، غذاها، مواد محافظ و رنگ ها.
- در صورت ابتلا به پرفشاری خون کنترل نشده، اختلالات کبدی، اکلامپسی و پره اکلامپسی و سابقه آن.
- در صورت مصرف هر گونه دارو به خصوص داروهایی مانند متیل دوبا و رزربین، دیپامین بالکرها (مانند متوکلوپرامید و داروهای نورولپتیک مانند فنوتیازین ها و تیوتیکسین ها).
- مصرف هیچ دارویی را بدون مشورت با پزشک آغاز و یا قطع نکنید.

نکات قابل توصیه به هنگام مصرف دارو:

- به طور کلی آکونیتست های دیپامین نباید در کسانی که به فشار خون بالا در حین حاملگی مبتلا هستند استفاده شوند مگر اینکه پزشک تشخیص دهد که مزایای دارو از مضرات آن بیشتر است.
- چنانچه در حین مصرف این دارو احتمال حاملگی وجود داشته باشد و یا تصمیم به حاملگی داشته باشید حتماً پزشک خود را مطلع کنید.
- الکل باعث تشدید عوارض جانبی این دارو می شود. در حین درمان با کابرلین از مصرف الکل خودداری نمایید.
- مصرف این دارو ممکن است باعث خواب آلودگی گردد، لذا ضمن درمان، از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید.
- برای پیشگیری از بروز سرگیجه هنگام بلند شدن از حالت نشسته یا دراز کشیده، آهسته تغییر وضعیت دهید.

مصرف در بارداری:

مصرف این دارو در حاملگی توصیه نمی شود.

مصرف در شیردهی:

از آنجایی که دارو سبب کاهش و مهار ترشح شیر می گردد، لذا در زمانی که قصد شیردهی دارند نباید مصرف شود.

مقدار مصرف دارو:

درمان علائم پارکینسون:

دوز اولیه در صورت تک درمانی ۰/۵ میلی گرم در روز و در صورت درمان کمکی همراه با لوودوپا ۱ میلی گرم در روز می باشد، مقادیر فوق هر یک

الی دو هفته به میزان ۰/۵ تا ۱ میلی گرم افزایش می یابد تا پاسخ مناسب حاصل گردد.

در افرادی که تحت درمان با لوودوپا بوده اند با افزایش تدریجی مقدار کابرلین، می بایست مقدار لوودوپا کاهش یابد تا زمانی که تعادل مناسب بین مقدار دو دارو ایجاد شود. حداکثر دوز درمانی ۳ میلی گرم در روز می باشد که به صورت یک بار در روز مصرف می گردد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید. ضعف و خستگی مفرط، تهوع، استفراغ، یبوست یا اسهال، سردرد، سرگیجه، خواب رفتن دست ها و پاها، تغییر حالت روانی، اختلال در تمرکز، تورم دست و پا و قوزک پا، درد سینه، اختلالات قاعدگی، اختلال دید، دردهای شکمی، کاهش اشتها، افت ناگهانی فشار خون در اثر تغییر وضعیت از نشسته یا خوابیده به حالت ایستاده، سوزش، هاضمه، خشکی دهان، نفخ، علائم شبه آنفلوآنزا، گرگرفتگی، اختلال در خواب، افسردگی، درد عضله و مفاصل، خارش، درد دندان، آبریزش بینی، آکنه و افزایش میل جنسی.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

شرکت داروسازی ایران هورمون، تهران، ایران

تلفن صفای مشتری: ۰۱۹-۵۵۱۷۰۴۴۹۰ داخلی ۳۵۸

شرکت داروسازی ایران هورمون

IRAN HORMONE PHARMACEUTICAL Co.

