

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا تومیه آن به دیگران خودداری فرمایید.
قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک مشورت نمایید:

- حساسیت به آسپیرین و یا دیگر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی.
- سابقه ابتلا به بیماری‌هایی نظیر آسم، انقباض مجاری هوایی به واسطه وجود پولیپ بینی، خونریزی گوارشی، بیماری‌های قلبی - عروقی، افزایش فشار خون، نارسایی احتقانی قلب و نارسایی عملکرد کلیه و کبد.
- مصرف داروهایی مانند مهارکننده‌های آنزیم میلد آنتی‌بیوتاسین، آسپیرین، فورزماید، لیتیم، متوترکسات، وارفارین یا سایر آنتی‌کوآگولانت‌ها.
- مصرف الکل و سیگار.
- مصرف در بارداری و شیردهی.

نکات قابل تومیه به هنگام مصرف دارو:

- در صورت مصرف طولانی مدت این دارو به طور مرتب به پزشک مراجعه نمایید.
- از مصرف دو یا چند داروی ضد التهاب غیراستروئیدی (NSAIDs) به طور هم زمان خودداری نمایید.
- در صورت مشاهده علائمی مانند ادم، خونریزی گوارشی، مشکلات قلبی - عروقی، افزایش وزن غیر عادی و بثورات پوستی سریعاً به پزشک خود اطلاع دهید.
- در صورت مشاهده علائم سمیت کبدی مانند تب، خستگی، خارش، سستی، تهوع و درد شکمی به پزشک مراجعه نمایید.
- توجه داشته باشید که مصرف این دارو باعث تغییر در نتایج آزمون‌های عملکرد کبدی (ALT, AST) می‌گردد.
- مصرف این دارو به عنوان ضد درد در بیماران که کاندید عمل جراحی عروقی گردن می‌باشند ممنوعیت دارد.
- این دارو را می‌توان با معده خالی یا همراه غذا با یک لیوان آب مصرف نمود.
- در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است از مصرف آن و یا دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند ولی مقدار تجویز معمول این دارو به قرار زیر است:

جهت درمان آرتريت روماتويد و استئوآرتريت در بزرگسالان: دوز شروع درمان و دوز نگهدارنده دارو ۷/۵ میلی‌گرم یک بار در روز و حداکثر دوز دارو ۱۵ میلی‌گرم یک بار در روز است.
کودکان: ایمنی مصرف این دارو در کودکان و افراد زیر ۱۸ سال ثابت نشده است.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک خود مشورت کنید.
واکنش‌های آلرژیک، آسم، ناراحتی قلبی، کولیت، تشنج، تنگی نفس، خونریزی گوارشی، کاهش یا افزایش فشار خون، لکوپنی، مدفوع خونی، التهاب پانکراس، آتمی، یرقان، سندرم استیونس-جانسون و اختلالات کلیوی از جمله عوارضی هستند که در صورت مشاهده آنها باید سریعاً به پزشک مراجعه شود.
سوزش، هائمه، نفخ، دردهای شکمی، اسهال، اختلالات بینایی، ریزش مو، اضطراب، گیجی، بیبوست، تهوع و استفراغ، خشکی دهان، افسردگی، خواب آلودگی، تعریق زیاد، تب و افزایش یا کاهش وزن از دیگر عوارض این دارو می‌باشند که در صورت تداوم آنها بهتر است با پزشک معالج خود مشورت نمایید.

مصرف در بارداری:

انجمن غذا و داروی ایالات متحده (FDA) مصرف این دارو را در بارداری در رده C قرار داده است. بدین معنی که مطالعات انجام گرفته بر روی حیوانات آزمایشگاهی حاکی از تاثیر سو، بر روی جنین است اما مطالعات کافی و کنترل شده در خصوص مصرف این دارو در دوران بارداری در انسان وجود ندارد، بنابراین مصرف این دارو در دوران بارداری به خصوص سه ماهه سوم توصیه نمی‌شود.

مصرف در شیردهی:

از آنجایی که مطالعات کافی مبنی بر ترشح این دارو در شیر مادر در دسترس نمی‌باشد، مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی‌گردد و در صورت تجویز و الزام استفاده دارو توسط پزشک، می‌بایست شیردهی متوقف گردد.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

تلفن سمدی مشتری: ۱۹-۱۷۱-۴۴۹۰۵۵ داخلی ۳۵۸

