

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک مشورت نمایید:

– وجود هر نوع حساسیت به سولفونیل اوره ها، داروهای سولفونامیدی و دیورتیک‌های تیازیدی، غذاها، مواد محافظ و رنگ‌ها.
– در صورت بارداری و شیردهی.

– در صورت مصرف داروهایی نظیر: آسپاریناز، بتابلاکرها، کلرامفیکل، آنتی کوآگولانت‌ها، کورتیکواستروئیدها، کتراسپتوئها، دیورتیک‌ها، هورمون‌های تیروئیدی، مهارکننده‌های مونوآمینواکسیداز، سامپتیدین، ضدقارح‌های آرولی، سیکلوسپورین، لیتیم، فلوروکینولون‌ها، رانیتیدین و سالیسیلات‌ها در دوزهای بالا و الکل.

– در صورت ابتلا به بیماری‌هایی نظیر:

استفراغ طولانی مدت، اسهال شدید، تب بالا، عفونت حاد، بیماری‌های کبدی و کلیوی، پورفیری حاد، کمای دیابتیک و کمای هایپر اسمولار غیر کتونیک، کتواسیدوز، سوختگی شدید، تروما، هایپراآدرنالیزم کنترل نشده، نارسایی هیپوفیز، هایپرتریونیدیزم کنترل نشده و سو، تغذیه.

نکات قابل توصیه به هنگام مصرف دارو:

– به طور مرتب به پزشک خود مراجعه نمایید.

– در صورت داشتن عفونت و جراحات حاد به پزشک خود اطلاع دهید.

– اگر مصرف یک قرص را فراموش کردید به محض یادآوری آن را مصرف نموده و سپس قرص بعدی را در وقت مقرر مصرف نمایید و در این صورت ممکن است در یک روز دو قرص را با هم مصرف نمایید و بقیه قرص‌ها را طبق روال معمول ادامه دهید.

– هنگام در معرض آفتاب قرار گرفتن از کرم‌های ضد آفتاب و لباس‌های محافظ در برابر آفتاب استفاده نمایید.

– به طور مرتب گلوکز خون را تحت کنترل داشته باشید.

– رعایت رژیم غذایی، تمرینات ورزشی و کاهش وزن هم زمان با مصرف این دارو از اهمیت فراوان برخوردار است.

– درمان دیابت به طور معمول برای تمام طول عمر می باشد.

– در صورت نیاز به جراحی پزشک خود را از مصرف دارو مطلع نمایید.

– در صورت مشاهده علائم هایپوگلیسمی شامل تعریق، ضعف، تپیدگی، اضطراب، تاری دید، گیجی، رنگ پریدگی، گرگرفتگی شدید، سردرد، تهوع و عصبانیت می توان قند و یا مایعات شیرین مصرف نموده و به پزشک خود مراجعه نمایید.

– در صورت مشاهده علائم هایپرگلیسمی و کتواسیدوز مانند تاری دید، خستگی، خشکی دهان، پوست خشک و برافروخته، تنفس سریع و عمیق با بوی خاص (مشابه بوی استون)، افزایش حجم و تعداد دفعات دفع ادرار، تهوع، استفراغ و تشنگی مفرط سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.

مقدار مصرف:

جهت درمان دیابت نوع دو:

دوز اولیه: ۱۶۰ میلی گرم دو بار در روز همراه غذا.

دوز نگهدارنده: ۸۰ تا ۳۲۰ میلی گرم در روز همراه غذا.

کودکان: دوز دارویی برای کودکان توسط پزشک تعیین می گردد.

مصرف در بارداری:

مطالعات بر روی انسان تاکنون انجام نشده است. ولی مصرف این دارو در دوران بارداری توصیه نمی شود.

مصرف در شیردهی:

در خصوص ورود این دارو به شیر مادر تاکنون مطالعاتی انجام نشده است. ولی مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید:

هایپو گلیسمی، نگرانی، اضطراب، عرق سرد، سردرد، تهوع، کابوس‌های شبانه، تب، زردی، دوبینی، واکنش‌های پوستی مانند: درماتیت اگسوفلیاتیو، پیوست و سو، هاضمه.

عوارضی که شیوع نادر دارند:

آتمی آپلاتیک، گرانولوسیتوز، لکوپنی، ترومبوسیتوپنی، مشکلات کبدی، هایپواترمی (Dilution) و سندرم ترشح نامتناسب هورمون آنتی دیورتیک و پرکان کستاتیک.

شرایط نگهداری:

– دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

– دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

– از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

