

تریامسینولون استوناید
۴۰ میلی گرم در ۱ میلی لیتر
کورتیران
سوسپانسیون تزریقی

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:
این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز گردیده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:
- وجود هر نوع حساسیت به کورتیکوئیدها یا آدرنوکورتیکوئیدها و موارد دیگر از قبیل غذا، مواد محافظ و رنگ ها.
- در صورت ابتلا به بیماری هایی نظیر ایدز، عفونت های قارچی سیستمیک، اختلالات دستگاه گوارش، بیماری های قلبی، نارسایی احتقانی قلب، بیماری های کلیوی، دیابت، میاستنی گراویس، استئوپروز و سل.

- در صورت بارداری و شیردهی.
نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:
هشدار: از مصرف دارو به صورت تزریق وریدی، داخل جلدی و داخل شایعه خودداری شود.
به علت وجود بنزیل الکل، این دارو نباید در نوزادان نارس یا رسیده بکار رود.

- بدون اطلاع پزشک از مصرف هم زمان این دارو با داروهای نظیر آنتی اسیدها، فرم تزریقی آمفوتریسین ب، داروهای خوراکی ضد دیابت، گلیکوزیدهای دیورتال، دیورتیک ها، داروهای القا کننده آنزیم کبدی، منابع پتاسیم، داروهای حاوی سدیم، هورمون رشد انسانی، واکسن ها و فراآورده های حاوی الکل خودداری کنید.
- در درمان دراز مدت ممکن است محدودیت مصرف سدیم و کالری و مصرف مکمل پتاسیم و پروتئین بیشتر مورد نیاز باشد.
- از مصرف بیش از مقدار و مدت توصیه شده توسط پزشک خودداری نمایید.

- معاینات چشم پزشکی در طول درمان دراز مدت به طور مرتب باید انجام شوند.

- پیش از قطع مصرف دارو به پزشک مراجعه کنید زیرا امکان است قطع تدریجی مصرف دارو لازم باشد.

- در صورت بروز عفونت ها یا ضایعات جدی باید احتیاط کرد.
- در صورتیکه در حین مصرف این دارو با افراد مبتلا به سرک یا آبله مرغان مواجه شدید ممکن است اقدامات پیشگیرانه لازم باشد.

- جهت یکنواخت سازی سوسپانسیون بلافاصله قبل از تزریق

آمپول را به آرامی تکان دهید.

- این دارو اینست اختلال با باعث هوشیاری شود بنابراین در رانندگی یا کار با ماشین آلات می بایست احتیاطات لازم را رعایت کرد.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول دارو به قرار زیر است:

داخل عضله، دوز اولیه ۶۰ میلی گرم به صورت عمیق داخل عضله گولتال تزریق می شود.

معمولا دوز ۱۵ بین ۴۰ تا ۸۰ میلی گرم بسته به پاسخ دهنی بیمار و طول درمان تنظیم می شود.

داخل فمصل، داخل سینوئیم و غلاف تاندون: برای فواصل کوچک ۵-۲/۵ میلی گرم و برای فواصل بزرگتر ۱۵-۵ میلی گرم تزریق می شود (در مجموع گاهی تا ۴۰ میلی گرم نیز تزریق می شود).

در کودکان، دوز این دارو در کودکان بر اساس وزن و سطح بدن آنها طبق نظر پزشک محاسبه می گردد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت شود.

کاهش اشتها، سوء هاضمه، عصبانیت، بی قراری، اشکال در به خواب رفتن، سرگیجه، برفروختگی، سردرد، افزایش درد مفاصل، افزایش تعریق، گیجی و افزایش غیر طبیعی رشد موی بدن و صورت از جمله عوارض این دارو می باشد.

همچنین به دنبال مصرف دراز مدت آن عوارضی همچون درد شکم و معده، کتفه، مدفوع خون آلود، ضریان نامنظم قلب، اختلالات قاعدگی، خستگی و ضعف غیر معمول، استفراغ، کاهش یا اختلال در دید و تکرر ادرار مشاهده شده است.

شرایط نگهداری:

دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

- دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.

- از مصرف داروی تاریخ گذشته اجتناب نمایید.

تلفن صدای مشتری: ۱۹-۱۷۰۵۵۱۴۴۹۰ داخلی ۳۵۸

شرکت داروسازی ایران هورمون

IRAN HORMONE PHARMACEUTICAL Co.

