

## دکامتازون

(۸ میلی گرم در ۲ میلی لیتر)

## دکامزون

آمپول

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری ریوی ففلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری ننمایید.

**قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:**

– وجود هر نوع حساسیت به کورتیکوئیدها یا آدرنوکورتیکوئیدها و مواد دیگر از قبیل غذاها، مواد محافظ و رنگ ها.

– در صورت ابتلا به بیماری هایی نظیر ایدز، عفونت های قارچی سیستمیک، عفونت های ویروسی و باکتریایی، اختلالات دستگاه گوارش، بیماری های قلبی، نارسایی اختلالی قلب، بیماری های کبدی و کلیوی، دیابت، میاستنی گراویس، استنوزوز، سل، سایکوز، کم کاری یا پر کاری تیروئید، فشار خون بالا، لوپوس اریتماتوز سیستمیک.

– در صورت حاملگی و شیردهی.

**نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:**

– بدون اطلاع پزشک از مصرف هم زمان این دارو با داروهای نظیر فرم تزریقی آفتوئرسین ب، داروهای ضد دیابت، گلیکوزیدهای دیجیتال، دیورتیک ها، داروهای القا کننده و مهار کننده آنزیم کبدی، منابع پتاسیم، داروهای حاوی سدیم، هورمون رشد انسانی، واکسن ها و الکل، استامینوفن، ضد التهاب های غیر استروئیدی، آسپرین، آمینوگلوکوتامید، استروئیدهای آتاپولیک، آندروژن ها، آنتی بیوتیک های ماکرولاید، آنتی کوآگولانت ها و آنتی کولین استرژاها، ضد انعقادها، ضد افسردگی های سه حلقه ای، داروهای تیروئیدی، کنترااستپتوهای خوراکی، فولیک اسید، اینترنیزاید، کتوکونازول، استازولامید، داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی، ریتودرین، تالیدومید، میتوان، مگزولین خودداری کنید.

– در درمان دراز مدت ممکن است محدودیت مصرف سدیم و کالری و مصرف بیشتر مکمل پتاسیم و پروتئین مورد نیاز باشد.

– از مصرف بیش از مقدار و مدت توصیه شده توسط پزشک خودداری نمایید.

– معاینات چشم پزشکی در طول درمان دراز مدت بطور مرتب باید انجام شود.

– پیش از قطع مصرف دارو به پزشک مراجعه کنید زیرا ممکن است قطع تدریجی مصرف دارو لازم باشد.

– در صورت بروز عفونت ها یا ضایعات جدی باید احتیاط کرد.

– چنانچه در حین مصرف این دارو با افرادی که دچار سرخک یا آبله مرغان هستند مجاور شوید ممکن است اقدامات پیشگیرانه لازم باشد.

– این دارو ممکن است باعث اختلال در هوشیاری شود بنابراین در رانندگی یا کار با ماشین آلات می بایست احتیاط لازم را رعایت کرد.

**مقدار مصرف دارو:**

– دوز آژ عمومی در بزرگسالان:

۲/ تا ۴ میلی گرم به صورت ۳ مرتبه داخل مفصلی، داخل ضایعه یا داخل بافت نرم تزریق می گردد.

– در صورت نیاز می توان به فواصل ۳ روز تا ۳ هفته این دوز را تکرار کرد. جهت تزریق عضلانی می وریدی ۹-۵/ میلی گرم در روز دگزامتازون قابل استفاده می باشد.

– ادم مغزی:

دوز اولیه ۱۰ میلی گرم به صورت تزریق وریدی می باشد سپس هر ۶ ساعت ۴ میلی گرم تزریق عضلانی صورت می گیرد تا زمانی که علائم فروکش نماید. دوز دارو را می توان پس از ۴-۲ روز کاهش داد و به تدریج طی دوره ۵ تا ۷ روزه آن را قطع نمود.

## Dexamethasone

(8mg / 2ml)

## Decameson

Ampoule

در ادم مغزی راحه یا بیماری که تومور مغزی غیرقابل جراحی دارند از درمان کمکی استفاده می شود بدین ترتیب که ابتدا ۲ میلی گرم ۲ تا ۳ بار در روز به صورت عضلانی تجویز می گردد سپس براساس پاسخ بیمار دوزهای بعدی تنظیم می گردد.

– شوک:

ابتدا ۲۰ میلی گرم به صورت وریدی تزریق می گردد سپس ۳۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن از طریق انفوزیون وریدی طی ۲۴ ساعت تجویز می شود.

– اختلالات آلرژیک: ابتدا ۸-۴ میلی گرم عضلانی تزریق می گردد سپس دوز نگهدارنده به صورت خوراکی تجویز می شود.

– شوک و استفراف ناشی از شیمی درمانی: ۲۰-۸ میلی گرم به صورت وریدی ۵ تا ۱۵ دقیقه قبل از شیمی درمانی تجویز می شود.

سپس درمان با قرص دگزامتازون پس از پروسه شیمی درمانی ادامه می یابد.

– پیشگیری از سندرم زجر تنفسی در نوزادان: ۵ میلی گرم هر ۱۲ ساعت تا ۴ دوز که به صورت عضلانی ۷ روز تا ۲۴ ساعت قبل از تاریخ تخمین زده شده برای زایمان تزریق می شود.

کودکان: دوز دارو براساس وزن و سطح بدن آنها طبق نظر پزشک مشخص می گردد.

**هشدار:** این دارو حاوی متابی سولفیت سدیم می باشد و در افراد حساس بخصوص آسماتیک ممکن است باعث تشدید حمله آسم شود.

– رقیق سازی دارو جهت انفوزیون وریدی و محلول دکستروز یا سدیم کلراید تزریقی صورت می گیرد.

**عوارض جانبی:**

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت شود.

افزایش اشتها، سو، هاضمه، عصبانیت، بی قراری، اشکال در به خواب رفتن، سرگیجه، برافروختگی، تومع، سرخوشی، افسردگی، اختلالات مانیک – دپرسیو، سردرد، افزایش درد مفاصل، افزایش تعریق، منگی و افزایش غیر طبیعی رشد موی بدن و صورت، آکنه، ضرابان نامنظم قلب، اختلالات قاعدگی،

خستگی و ضعف غیر معمول، استفراغ، اختلال یا کاهش دید، تکرر ادرار، درد و عفونت و آرتروزی در محل تزریق، تشنج، نارسایی قلبی، ترموبومبولی، پانکراتیت، دیابت ملیتیوس، واکنش های آلرژیک، سندرم کوشینگ، کاتاراکت، هیپوکالمی، افزایش فشار داخل جمجمه، پوکی استخوان، هایپرانتسبون،

اختلالات گوارشی شامل زخم معده یا علانی مانند مدفوع خون آلود و درد شکم و معده، پوست نازک و شکننده، پارگی تاندون، احتیاس سدیم و احتیاج، نکروز استخوان (اواسکولار) و سرکوب سازک کودکان.

**شرایط نگهداری:**

– دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت ننمایید.

– دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری ننمایید.

– از مصرف داروهای تاریخ گذشته اجتناب کنید.

تلفن مدای مشتری: ۱۷۰۹۱۵۵۱۰۴۴۹ داخلی ۳۵۸

شرکت داروسازی ایران هورمون  
IRAN HORMONE PHARMACEUTICAL CO.

