

ناندرولون دکانات ۲۵

Decandrolone

Injectable Solution

ناندرولون دکانات ۲۵

دکاندرولون

محلول قابل تزریق

راهنمایی های عمومی برای مصرف دارو:

– این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا تومیه آن به دیگران جداً خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

– وجود هر نوع حساسیت به استروئیدهای آنبولیک یا آندروژن ها و مواد دیگر از قبیل غذاها، مواد محافظ و رنگ ها.

– در صورت ابتلا به بیماری هایی نظیر سرطان پستان، دیابت ملیتوس، بزرگی پروستات و یا سرطان پروستات، بیماری های قلبی و عروقی، بیماری کلیوی و کبدی و بالا بودن میزان کلسیم خون یا سابقه آن.

– در صورت مصرف هم زمان با داروهای زیر:

فنی تونین، والپروئیک اسید، کلروکین، تالترکسون، استامینوفن، استروژن ها، متیل دوپا، فئوتینازین ها و آندروژن ها (هورمون های مردانه).

– در صورت بارداری و شیردهی.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:

– دارو را دقیقاً طبق تجویز پزشک مصرف نمایید و از مصرف مقادیر بیشتر دارو جداً خودداری نمایید.

– به منظور تاثیر بهتر دارو طبق تجویز پزشک از رژیم های غذایی حاوی پروتئین و کالری زیاد استفاده نمایید.

– در صورتی که یک نوبت از دارو را فراموش کردید به محض به یادآوردن آن را مصرف کنید اما اگر تقریباً نوبت بعدی مصرف دارو فرا رسیده است آن نوبت از دارو را حذف و به هیچ وجه مقدار مصرف بعدی را دو برابر نکنید و مصرف دارو را طبق روال عادی ادامه دهید.

– به منظور کنترل بهبود بیماری باید بطور مرتب تحت نظر پزشک باشید.

– این دارو ممکن است باعث تغییر میزان قند خون در بیماران مبتلا به دیابت گردد لذا قبل از انجام هرگونه آزمایش در این زمینه با پزشک خود مشورت نمایید.

– مصرف این دارو در مردان سالخورده ممکن است سبب بروز بزرگی پروستات یا سرطان پروستات گردد.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف ناندروولون در زنان باردار و شیرده به طور معمول پیشنهاد نمی شود ولی در موارد اضطراری باید با نظر پزشک متخصص مصرف گردد.

مصرف در کودکان:

مصرف در کودکان ممکن است باعث توقف رشد گردد و ممکن است باعث رشد جنسی زودرس در پسران و باعث ایجاد صفت مردانه در دختران گردد.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند. مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:

جهت مصرف در کم خونی حاصل از نارسایی کلیه در خانم ها: ۱۰۰-۵۰ میلی گرم به فاصله ۱ تا ۴ هفته به صورت عضلانی تزریق می شود.

در آقایان: ۲۰۰-۵۰ میلی گرم به فاصله ۱ تا ۴ هفته به صورت عضلانی تزریق می گردد. بنابر تشخیص پزشک ممکن است درمان تا ۱۲ هفته نیز ادامه یابد. بدین صورت که پس از ۴ هفته یک دوره استراحت بدون دریافت دارو به بیمار داده شده و پس از آن سیکل درمانی با توجه به نظر پزشک ادامه می یابد.

کودکان بین ۲ تا ۱۳ سال: ۵۰-۲۵ میلی گرم به صورت تزریق عضلانی در طول ۳ تا ۴ هفته.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود.

اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت شود.

عوارض جانبی در خانم ها: آکنه یا پوست چرب، بزرگ شدن کلیتوریس، کلفت شدن صدا، رشد یا ریزش غیر طبیعی مو، عادت ماهیانه نامنظم و به ندرت افسردگی.

عوارض جانبی در آقایان: آکنه، کاهش فعالیت جنسی.

عوارض جانبی در پسران: بزرگ شدن آلت تناسلی، رشد غیرطبیعی مو، افزایش فعالیت نعوظ.

عوارض مشترک بین خانم ها و آقایان که به محض مشاهده این عوارض باید به پزشک مراجعه شود: درد استخوان، افزایش غیر عادی وزن، سرگیجه و تهوع.

سایر عوارض جانبی که به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو رفع می شوند عبارتند از: احساس سرما، اسهال، درد و نفخ معده، گرفتگی عضلات، اشکال در به خواب رفتن و کاهش غیر عادی تمایلات جنسی (در صورت ادامه یافتن این عوارض به پزشک اطلاع دهید).

شرایط نگهداری:

– دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

– دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.

تلفن صدای مشتری: ۱۹-۰۵۵۱۷۰۴۴۹۰ داخلی ۳۵۸

شرکت داروسازی ایران هورمون
IRAN HORMONE PHARMACEUTICAL Co.

