

متیل پردنیزولون استات ۴۰ Methylprednisolone Acetate 40

Depocortine

40 mg/ 1ml

Injectable Suspension

۴۰ میلی گرم در ۱ میلی لیتر

سوسپانسیون تزریقی

راهنمایی های عمومی برای مصرف دارو

این دارو برای درمان بیماری‌ها شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران جدا خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک مشورت نمایید

– وجود هر نوع حساسیت به کورتیکوئیدها یا آدرنوکورتیکوئیدها و موارد دیگر از قبیل غذاها، مواد محافظ و رنگ ها.

– در صورت ابتلا به بیماری‌هایی نظیر ایدز، عفونت‌های عمومی یا موضعی، اختلالات دستگاه گوارش، بیماری‌های قلبی، نارسایی احشانی قلب، بیماری‌های کلیوی، دیابت، میاستنی گراویس و استئوپروز.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو

– بدون اطلاع پزشک از مصرف هم زمان این دارو با داروهای نظیر آنتی اسیدها، سرم تزریقی، آفتورئیسین B، آنتی بیوتیک‌های ماکرولید، داروهای خوراکی ضد دیابت، گلیکوزیدهای دیرپیتال، دیورتیک‌ها، داروهای القا کننده آنزیمی، دیابت، منابع پتاسیم، داروهای حاوی سدیم، هورمون رشد انسانی، واکسن‌ها و قرآورده‌های حاوی الکل خودداری نمایید. – در درمان دراز مدت ممکن است محدودیت مصرف سدیم و کالری افزایش مصرف مکمل پتاسیم و پروتئین مورد نیاز باشد. – از مصرف بیش از مقدار و مدت توصیه شده توسط پزشک خودداری نمایید.

– معاینات چشم پزشکی در طول درمان دراز مدت به طور مرتب باید انجام شوند.

– پیش از قطع مصرف دارو به پزشک مراجعه کنید زیرا ممکن است قطع تدریجی مصرف دارو لازم باشد.

– در صورت بروز عفونت‌ها یا ضایعات جدی به پزشک اطلاع دهید. – در صورت مشاهده تورم و یا قرمزی در محل تزریق و ادامه یا بدتر شدن آن به پزشک اطلاع دهید.

مقدار مصرف دارو

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:

دقت نمایید که این دارو فقط برای تزریق عضلانی، تزریق داخل مایع سینوویال و تزریق دریافت های نرم و یا داخل ضایعات پوستی مناسب است و هرگز نباید آن را به صورت وریدی و یا تزریقی داخل غلاف نخاعی و عضله دلتونیدی استفاده نمود.

در افراد بزرگسال:

– آرتريت روماتوئید: هر ۱ الی ۵ هفته:

در فواصل های بزرگ: ۸۰-۲۰ میلی گرم

در فواصل های متوسط: ۴۰-۱۰ میلی گرم

در فواصل های کوچک: ۱۰-۴ میلی گرم

– درمان اختلالات آلرژیک (شوگ آتافیلیکسی): ۱۰-۱۲۰ میلی گرم عضلانی.

– التهابات پوستی شدید: ۱۲۰-۱۰ میلی گرم عضلانی.

– درمان عفونت توپرکلوزیس تنفسی منتشر: ۱۲۰-۴ میلی گرم عضلانی در روز.

– مالتیپل اسکلروزیس: به صورت روزانه ۱۶۰ میلی گرم تا یک هفته سپس ۶۴ میلی گرم یک روز در میان به مدت یک ماه.

در اطفال: میزان آن بر اساس وزن و سطح بدن کودک توسط پزشک تعیین می شود.

عوارض جانبی

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود.

اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت شود.

افزایش اشتها، سو، هاضمه، معیبات یا بی قراری، اشکال در به خواب رفتن، سرگیجه، برافروختگی، سردرد، افزایش درد مفاصل، افزایش تعریق، اختلالات آب و الکترولیتی، میوپاتی ناشی از استروئیدها، منگی و افزایش غیر طبیعی رشد موی بدن و صورت از جمله عوارض این دارو می باشد. همچنین بدنبال مصرف دراز مدت آن عوارضی هم چون درد شکم و معده، کتکه، مدفوع خون آلود، ضربان نامنظم قلب، اختلالات قاعدگی، پوکی استخوان، کاهش حجم عضلات و سایر مشکلات عضلانی و اسکلتی، پانکراتیت، افزایش سطح آنزیم های کبدی، مشکلات پوستی (نازک شدن پوست، اشکال در سرعت بهبود زخم ها)، بالانس سفید، نیتروژن به دلیل کاتابولیسم پروتئین ها، واکشن های حساسیتی شدید، خستگی و ضعف غیر معمول، استراخ، کاهش یا اختلال در دید و تکرر ادرار مشاهده شده است.

شرایط نگهداری

– دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

– دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

– از مصرف داروی تاریخ گذشته اجتناب نمایید.

تلفن صدای مشتری: ۰۲۱-۴۴۹۰۵۵۱۷-۱۹ داخلی ۳۵۸

شرکت داروسازی ایران هورمون
IRAN HORMONE PHARMACEUTICAL CO.

