Medroxyprogesterone Acetate + Estradiol Cypionate

Depofem

Injectable Suspension

مدروکسی پروژسترون استات + استرادیول سیپیونات

دپوفم

سوسپانسیون تزریقی

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیربا پزشک مشورت نمایید:

– وجود هر نوع حساسیت به پروژستین ها، استروژن ها، غذاها، مواد محافظ و رنگ ها.

– در صورت داشتن هر نوع رژیم غذایی مانند رژیم غذایی کم نمک و یا رژیم غذایی دارای قند پایین.

– در صورت بارداری وشیردهی.

– در صورت استفاده از لنزهای تماسی.

– در صورت مصرف داروهای زیر:

آمینوگلوتتمید، کاربامازپین، فنوباربیتال، فنی توئین، اسیدآسکوربیک، ریفابوتین، ریفامپین، استامینوفن، فرآورده گیاهی هایپریکوم پرفوراتوم، آنتی بیوتیک ها، سیکلوسپورین، پردنیزولون، تئوفیلین، سالیسیلیک اسید، فنیل بوتازون.

– در صورت داشتن سابقه ابتلا به بیماری های زیر:

آسم، صرع، مشکلات قلبی، ناراحتی های کلیوی، سردردهای میگرنی، خونریزی های غیر طبیعی مثلاً وجود خون در ادرار و یا خونریزی غیرطبیعی از واژن، بیماری های پستان، دیابت ملیتوس، بیماری های کبدی و بیماری هایی که احتمال به پوکی استخوان را تشدید می کند، سابقه خانوادگی سرطان سینه، رحم و نئوپلازی وابسته به استروژن، ابتلا به سرطان تخمدان، احتباس مایعات، هایپرتانسیون، اختلالات ترمبو آمبولیک، سابقه یرقان کلستاتیک ، بیماری های عروق مغزی و عروق کرونر و بالا بودن کلسترول و تری گلیسیرید خون.

– افراد سیگاری بالای ۳۵ سال قبل از مصرف دارو می بایست با پزشک خود مشورت نمایند.

نکات قابل توصیه به هنگام مصرف دارو:

– این دارو را فقط تحت نظر پزشک مصرف نمایید.

– چنانچه خونریزی غیر منتظره از واژن برای مدت طولانی رخ داد با پزشک خود مشورت نمایید.

– چنانچه سیکل ماهیانه شما برای مدت ۴۵ روز از آخرین دوره قاعدگی تکرار نشد با پزشک خود مشورت نمایید.

– چنانچه احتمال می دهید به تأخیر افتادن قاعدگی شما به علت بارداری می باشد باید فوراً مصرف این دارو را قطع کنید و پزشک خود را مطلع نمایید.

– در صورت نیاز به انجام آزمایشات پزشکی، مصرف کردن این دارو را به پزشک معالج خود اطلاع دهید.

مقدار مصرف:

مقدار مصرف صحیح هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:

– برای جلوگیری از بارداری: مقدار مصرف این دارو به صورت تزریق عضلانی یک آمپول در ماه می باشد. اولین تزریق می بایست در پنج روز اول قاعدگی صورت گیرد.

– میتوان این دارو را در عضلات دلتوئید، سرینی بزرگ (Gluteus Maximus) و جلوی ران تزریق نمود.

– قبل از تزریق، آمپول محتوی دارو را به خوبی تکان دهید.

– فاصله بین دو تزریق حداقل ۲۸ روز و حداکثر ۳۳ روز میباشد.

مصرف در بارداری: مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع است.

مصرف در شیردهی: این دارو در شیر مادر ترشح می شود ولی اثرات آن بر روی شیرخوار مشخص نشده است. مصرف این دارو تا ۶ هفته پس از زایمان توصیه نمی گردد.

عوارض جانبی:

هر دارویی به موازات اثرات درمانی دارای برخی عوارض ناخواسته می باشد، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولیکن درصورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

سر درد میگرنی، تغییر در بینایی، افزایش دفعات خونریزی ماهیانه، افزایش و یا کاهش حجم خون در دوره قاعدگی، توقف سیکل ماهیانه، تغییر در اشتها، جوش های پوستی، تورم صورت و پاها، آکنه، کاهش میل جنسی، سفتی و درد پستان، تغییر وزن، درد شکمی، افسردگی، تهوع، آلوپسی، آمنوره، واکنش های آنافیلاکتیک، لخته شدن خون، حملات قلبی، یرقان کلستاتیک، ناپایداری احساسات، عصبانیت، عدم تحمل کربوهیدرات ها، تغییر در متابولیسم چربی ها، لک های پوستی، عفونت های واژن و احتباس آب و نمک.

شرایط نگهداری:

۱– دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

۲– از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

۳– دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

تلفن صدای مشتری: ۱۹ – ۴۴۹۰۵۵۱۷ داخلی ۳۵۸

شرکت داروسازی ایران هورمون

IRAN HORMONE PHARMACEUTICAL Co.