

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری ننمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

وجود هر نوع حساسیت به اکساندرولون و مواد دیگر از قبیل غذاها، مواد محافظ و رنگ ها.

ابتلا به بیماری‌هایی مانند سرطان پروستات و پستان در آقایان، سرطان پستان در خانم‌ها، دیابت ملیتوس، بیماری‌های قلبی-عروقی، بیماری‌های کلیوی و کبدی، افزایش کلسیم خون و سابقه انفارکتوس میوکارد.

مصرف آنتی‌کوآگولانت‌ها و داروهای هیپوتنوسیک.

مصرف در کودکان و سالمندان.

بارداری و شیردهی.

در هنگام مصرف این دارو رعایت موارد زیر توصیه می‌شود:

دارو را دقیقاً طبق دستور پزشک مصرف کرده و از مصرف مقادیر بیشتر دارو جداً خودداری ننمایید.

به منظور عدم ناسازگاری دارویی در مورد مصرف هر نوع دارو چه با نسخه و چه بدون نسخه با پزشک مشورت نمایید.

برای دستیابی به حداکثر اثر درمانی هنگام مصرف این دارو، برقراری رژیم غذایی متعادل پروتئین و کالری کافی اهمیت دارد.

در صورت مصرف در کودکان، توصیه می‌شود بررسی رشد استخوانی توسط رادیوگرافی هر ۶ ماه یکبار صورت گیرد.

از آنجایی که استروئیدهای آتاروپیک سبب کاهش میزان قند خون می‌گردد لذا در بیماران دیابتی، تنظیم دوز انسولین و داروهای کاهنده قند خون خوراکی مورد نیاز می‌باشد.

مصرف در بارداری:

مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع است.

مصرف در شیردهی:

در ارتباط با ترشح دارو به شیر مادر اطلاعات دقیقی در دسترس نیست اما از آنجایی که احتمال بروز عوارض جانبی خطرناک در شیرخوار وجود دارد لذا توصیه می‌گردد جهت عدم مصرف این دارو در دوران شیردهی و یا متوقف کردن شیردهی در صورت نیاز به مصرف دارو با پزشک معالج مشورت گردد.

موارد و مقدار مصرف دارو:

کاهش دردهای ناشی از پوکی استخوان.

درمان کمکی در کاهش وزن ناشی از وضعیت‌های کاتابولیک مانند جراحی‌های

وسیع، عفونت‌های مزمن، مصرف طولانی مدت کورتیکواستروئیدها، سوختگی، ترومای شدید، هیپاتیت الکلی یا هر گونه کاهش وزن با علت نامشخص.

از مضار جانبی این دارو، درمان کوتاهی قد ناشی از سندرم ترنر و کاهش وزن ناشی از HIV می‌باشد.

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:

۲۰-۲ میلی گرم در روز به صورت خوراکی در ۲ تا ۴ دوز منقسم.

دوره درمان مناسب معمولاً ۲-۴ هفته می‌باشد. در صورت نیاز می‌توان به طور متناوب دوره درمان را تکرار کرد.

کودکان: دوز معمول دارو در کودکان ۰/۱ میلی گرم یا کمتر به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن می‌باشد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید:

آکنه، کلفت شدن صدا، پیروید نامنظم، افزایش یا کاهش غیر عادی مو و هاپیرکلسمی در زنان، بزرگ شدن آلت تناسلی، افزایش دفعات تعویض، رشد غیرعادی مو و تیرگی پوست در مردان نابالغ، تکرر ادرار، بزرگ شدن پستان و پریاپیسم در مردان بالغ.

از عوارض دیگر این دارو می‌توان به اتمی، ادم، تهوع، استفراغ، اختلال عملکرد کبدی و اختلالات انعقادی اشاره نمود.

سایر عوارض جانبی که به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو رفع می‌شوند عبارتند از: احساس سرما، اسهال، درد و نفخ معده، گرفتگی عضلات، اشکال در به خواب رفتن و افزایش یا کاهش تمایل به جنسی.

شرایط نگهداری:

دارو را در دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

تلفن مندای مشتری: ۱۹-۰۵۵۱۷۰۴۴۹ داخلی ۳۵۸

شرکت داروسازی ایران هورمون
IRAN HORMONE PHARMACEUTICAL Co.

