

Desoceptive

Contraceptive DE

F.C. Tablet

دزوسپتپو

کنتر استپتپو دی ای

قرص روش دار

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا تومیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک مشورت نمایید:

- وجود هر نوع آلرژی به استروژن ها، پروژستین ها و مواد دیگر از قبیل غذاها، رنگ ها و مواد محافظ.

- در صورت مصرف داروهایی مانند کورتیکواستروئیدها، سیکلوسپورین، القا، کننده های آنزیم های کبدی، ریتوناویر، تنوفیلین، پیوگلیتازون، آنتی کوآگولانت ها، ضد افسردگی های سه حلقه ای، آنتی بیوتیک ها، داروهای ضد قارچ، سایتمیدین، دیلتازم، وریاپمیل، کاربامازپین، باربیتورات ها، فنی توئین، ترانکزامیک اسید، سلزلیپین، لاموتیزین، والپروات سدیم و آنترواستاتین.

در صورت ابتلا، به بیماری هایی نظیر سرطان سینه و رحم، بیماری های قلبی-عروقی، بیماری عروق کرونر، نئوپلازی وابسته به استروژن، بیماری کبدی، اختلالات مغزای، تومورهای کبدی، پرقان انسدادی، ترموموز، ترومبوفلیت، اختلالات ترومبوآمبولیک و خونریزی های غیر طبیعی رحم، دیابت ملیتوس، مرع، افزایش فشارخون، سردردهای میگرنی و افسردگی.

نکات قابل تومیه به هنگام مصرف دارو:

- در طول ۳ ماه اول مصرف ممکن است خونریزی نامنظم شود و احتمال لکه بینی نیز باشد که در صورت ادامه آن باید به پزشک معالج مراجعه شود.

- تومیه می شود که فاصله مصرف ۲ قرص متوالی بیش از ۲۴ ساعت نباشد.

- در اولین دوره مصرف این دارو، در ۷ روز اول از یک روش جلوگیری دیگر هم استفاده نمایید.

- دارو را در ساعت معین و ترجیحا با غذا میل کنید.

- در هنگام مصرف دارو از قرار گرفتن در معرض نور آفتاب خودداری نمایید.

- در صورت مشکوک شدن به بارداری مصرف دارو را قطع کرده و به پزشک مراجعه نمایید.

مصرف در دوران بارداری:

مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع می باشد.

مصرف در دوران شیردهی:

این دارو باعث تغییراتی در کیفیت و کمیت شیر مادر می گردد. همچنین مقدار کمی از دارو وارد شیر مادر شده و مدارکی دال بر اثرات این دارو بر روی شیرخوار گزارش شده است. لذا مصرف آن در این دوران تومیه نمی گردد مگر با نظر پزشک معالج.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو بدین صورت می باشد: روزانه یک عدد از اولین روز پریود (یکی از ۵ روز اول) به مدت ۲۱ روز مصرف می شود و پس از یک وقفه ۷ روزه مجددا مصرف ۲۱ قرص بعدی آغاز می گردد. (حتی اگر خونریزی قطع نشده باشد) در صورت فراموش نمودن یک دوز به محض یادآوری قرص بعدی را در وقت مقرر همان روز مصرف نمایید. در این صورت ممکن است در یک روز ۲ قرص مصرف شود.

اگر دو نوبت مصرف دارو را فراموش کردید و این دو نوبت مربوط به هفته های اول و دوم باشد روز یادآوری ۲ قرص و روز بعد نیز ۲ قرص مصرف نمایید. سپس روزانه یک قرص در زمان های مقرر استفاده نمایید. همچنین جهت اطمینان از یک روش ضد بارداری دیگر نیز استفاده کنید.

عوارض جانبی:

هر دارویی به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر کدام از عوارض زیر با پزشک مشورت کنید:

سرگیجه، تهوع، تغییر در لگوی خونریزی قاعدگی، ادم، دیسپن، سردرد، تغییرات پستان (ترشح، بزرگ شدن)، عفونت های واژینال، عفونت وزن (کاهش یا افزایش)، عدم تحمل نسبت به لنزهای تماسی، افزایش و یا کاهش موهای صورت و بدن، سلسا، راش، شکم درد و کاهش تحمل به کربوهیدرات ها.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و در جای خشک نگهداری نمایید.

تلفن صدای مشتری : ۰۹ - ۱۷۰۵۵۱۴۴۹ داخلی ۳۵۸



شرکت داروسازی ایران هورمون

IRAN HORMONE PHARMACEUTICAL Co.