

اندورین - آی اچ

دانیوژوست

قرصی خط دار خوراکی حاوی ۲ میلی گرم دینیوزست

پاشا از شروع مصرف اندورین-آی اچ و هر بار که قرار است مصرف این دارو را تکرار نمایان این بر که راهنما را مطالعه کنید زیرا ممکن است حاوی مطالب جدید باشد. این بر که راهنما را بخوانید و پزشک و داروساز را در مورد بیماری و یا درمان آن نمی باشد.

اندورین -آی اچ چیست و به چه منظور مصرف می شود:

قرص اندورین-آی اچ (آی اچ-دورین-آی اچ) حاوی ماده مؤثره دانیوژست با میزان ۲ میلی گرم می باشد و به گروه دارویی پروژستین ها تعلق دارد. اندورین-آی اچ برای درمان علائم دردناک اندومتریوز استفاده می شود.

آنچه باید پیش از مصرف اندورین-آی اچ بدانید:

اندورین-آی اچ برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران حتی در صورتی که علائم شبیه با شما را دارند خودداری نمایید.

مواردی که این دارو را نباید مصرف کنید:

- اگر به دانیوژست یا سایر ترکیبات فرمولاسیون حساسیت دارید

- در صورت ابتلا به خونریزی غیرطبیعی تشخیص داده نشده و/زائیل، بیماری فعال ترومبواسیولی وریدی (ایجاد لخته در رگ ها)، سابقه و یا ابتلا به بیماری های شریانی و قلبی- عروقی (مانند سکته قلبی، سکته مغزی، دیابت ملیتوس همراه با برگری عروقی، سابقه و یا ابتلا به بیماری شدید کبدی در حالی که آزمایش های کبدی غیر طبیعی می باشد. سابقه و یا ابتلا به فیبروز کبدی (خوش خیم یا بدخیم)، وجود و یا شک به وجود بدخیمی های وابسته به هورمون جنسی، آسیب های چشمی ناشی از بیماری های عروق چشم مانند از دست دادن نسی یا کامل بینایی یا نقص در میدان دید، سابقه و یا ابتلا به میگرن همراه با فوکل اوره شیردهی، بارداری و یا شک به بارداری

در طول مصرف این دارو باید بدانید:

- اندورین-آی اچ در دوران قبل از انعقادی (قبل از بلوغ)، در سالمندان یا به عنوان داروی ضد بارداری مورد مصرف ندارد.

- مصرف این دارو در بعضی از زنان با خونریزی های نامنظم قاعدگی (همانند انوره، خونریزی های مکرر یا غیرمکرر، خونریزی های طولانی مدت) همراه بوده و ممکن است در برخی زنان (برای مثال زنان مبتلا به فیبروزید) تشدید شود. معمولاً با گذشت زمان کاهش شدت الگوهای خونریزی مشاهده می شود. در صورتی که خونریزی های نامنظم با مصرف طولانی مدت ادامه یابد یا باستانی تدابیر تشخیصی مناسب (مانند نمونه برداری از اندومتر و سونوگرافی لگنی) جهت رد نمودن پاتولوژی اندومتر صورت پذیرد.

- در صورت خونریزی شدید طولانی مدت در طول درمان، یا باستانی مصرف دارو قطع شود.

- در برخی مطالعات درمان با پروژستین ها به تنهایی همراه با ریسک کم ترومبواسیولیس وریدی بوده است، بنابراین در طول درمان با این دارو در صورت مشاهده علائم و یا شک به وجود عارضه ترومبوسیتک، مصرف این دارو یا باستانی فوراً قطع گردد. - معاینات منظم پستان در طول درمان توصیه می شود. کیست های تخمدانی مقاوم که اغلب بدون علامت می باشند ممکن است در طول درمان ایجاد گردند.

- مصرف این دارو با کاهش متوسط در سطح استروژن اندوزن همراه است.

- در زنان مبتلا به دیابت یا افسردگی یا باستانی با احتیاط مصرف شود.

- در در بیماریاری که سابقه ریفاکت کلتانیک را طی دوران بارداری یا حین مصرف استروئیدهای جنسی داشته اند، در صورت بروز مجدد برفاق کلتانیک حین درمان یا باستانی دارو قطع شود.

- مصرف این دارو در بیماران با عدم تحرک طولانی مدت و نیز حداقل چهار هفته قبل از جراحی اکتیو باید متوقف شود و ادامه درمان یا باستانی دو هفته بعد از تحرک مجدد آغاز گردد. - در طول درمان با این دارو اند خطر سکته در زنان مبتلا به فشار خون بالا ممکن است افزایش یابد. در صورت مشاهده افزایش قابل توجه فشار خون، مصرف دارو یا باستانی فوراً قطع گردد. - خطر عوارض قلبی- عروقی در زنان سیگاری حین مصرف این دارو افزایش می یابد. لذا توصیه می شود در طول دوره درمان از مصرف سیگار خودداری گردد.

- مصرف پروژستین ها یا ضایعات عروقی شکلیه چشم همراه می باشد بنابراین طی معاینات در صورت بروز مواردی از قبیل از دست دادن ناگهانی یا کامل بینایی، بیرون زدگی ناگهانی چشم، دوبینی و تشدید میگرن، درمان باید متوقف گردد. - زنان با سابقه کولوسا (ریگ دانه دار شدن پوست به رنگ تیره) حین مصرف این دارو یا باستانی از قرار گرفتن در نور آفتاب یا تابش فارینش احتیاط کنند.

- در بیماران با سابقه خارش پوستی در طول دوران بارداری و یا به دلیل استفاده از استروئیدهای جنسی در صورت عود خارش حین درمان یا باستانی مصرف این دارو قطع گردد. - استفاده از ضد بارداری های هورمونی در طول دوره درمان با دانیوژست توصیه نمی شود و یا باستانی ضد بارداری های غیر هورمونی به کار گرفته شود. - اغلب در طول درمان با دانیوژست تخمک گذاری نمی شود اگرچه قاعدگی طبیعی معمولاً دو ماه پس از قطع مصرف دارو آغاز می گردد. - خطر ترومبواسیولیس ممکن است باافلاسه پس از زایمان افزایش یابد.

اندورین -آی اچ از چگونه نگهداری می شود:

- مقدار مصرف داروی شما را پزشک تعیین می کند. تمامی دستورال پزشک یا داروساز خود را با دقت دنبال کنید. این دستورات ممکن است با اطلاعات موجود در این برگه راهنما متفاوت باشد.

چه مقدار مصرف کنید: ۲ میلی گرم (یک قرص) یک بار در روز.

تنظیم دوز در اختلالات کبدی:

اختلالات خفیف تا متوسط: تنظیم دوز توسط منابع معتبر اعلام نشده است.

اختلالات شدید: در بیماران با سابقه و یا مبتلا به بیماری شدید کبدی منع مصرف دارد.

چطور مصرف کنید: قرص را به طور کامل یا یک لیوان آب بیاکید.

چه زمانی مصرف کنید: این دارو می تواند قبل یا بعد از غذا مصرف شود.

برای چه مدت مصرف کنید: مصرف دارو را تا زمان تعیین شده توسط پزشک خود ادامه دهید.

اگر مصرف دارو با فراموش کنید:

- اگر بخشی اندورین -آی اچ را ممکن است در صورت عدم مصرف یک دوز یا به دلیل استراغ و اسهال (اگر طی ۳ تا ۴ ساعت پس از مصرف رخ دهد) کاهش یابد بلافاصله پس از به یاد آوردن فقط یک قرص مصرف کنید سپس استفاده از دارو را مثل قبل ادامه دهید.

اگر دارو را بیش از حد معمول مصرف کردید:

بلافاصله با مرکز اطلاعات دارویی و سموم (DPIC) تماس بگیرید یا به بخش اورژانس نزدیک ترین بیمارستان مراجعه کنید.

آیا می دانید ۱۶۰ شماره تلفن مرکز اطلاعات دارویی و سموم در تهران و اکثر شهرستان ها می باشد؟

یادآوری و شریدهی:

- مصرف این دارو در دوران بارداری و یا در صورت شک به بارداری ممنوع می باشد.

- قبل از شروع درمان یا باستانی احتمال بارداری رد شود.

- اطلاعاتی در مورد ترشح این دارو در شیر مادر موجود نمی باشد.

مصرف همراه با سایر داروها:

- در صورت مصرف هر گونه داروی دیگر حین داروهای گیاهی، ویتامین ها و مکمل های غذایی که با نسخه یا بدون نسخه مصرف می به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.

- از استفاده همزمان با اندورین -آی اچ با الفا کتنده های بارودرت سیستم آنژی CYP3A4، مانند گریزوفلووین، ترانگزامیک اسید و بولی پروتستازل رهمیز نمایان.

اندورین -آی اچ ممکن است اثر با سطح داروهای تزریقی، سزولین و وریکونازول را افزایش دهد.

اثر اندورین -آی اچ ممکن است اثر با سطح اتازولازول، بوسپیرید، کوکسیستات، مهارکننده های پرودرت سیستم آنژی CYP3A4، میفیرستون، وریکونازول و گیاهان با خصوصیات پروژستینیک را افزایش دهد.

اندورین -آی اچ ممکن است اثر ضد انعقاد و اتانگویتسین های ویتامین K را کاهش دهد.

اثر از سطح اندورین -آی اچ ممکن است با داروهای زیر کاهش یابد:

اسیترین، امینوکلوئید، اپیرپات، آرتمز، رابینوترا، ها بکساروتن (سیستمیک)، ترکیبات ایجاد کتنده میکلس با اسیدهای صفراوی، بوستان، کاربامازپ، کلوفام، القا کتنده های بارودرت سیستم آنژی CYP3A4، دایرافنیت، دفارسیوکس، اسلی کاربازپین، فلیامات، فوس فنی توئین، متیپروزیس، میفیرستون، میکوفولات، لفلنایور، نوراپرین، اکتس کاربازپین، برامبال، فنی توئین، رهمیدون، پروکلواریلد، مشتقات ریتونوئیک اسید، مشتقات رفامپاسین، علف جای، سوگناداکس، تازپرویر، توسیلیوزیم، توپیرامات.

عوارض جانبی احتمالی مصرف اندورین -آی اچ می باشد:

در دوره به موالات اثر درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز هر گونه عارضه به خصوص عوارض زیر، با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایان: - افسردگی، سردرد، تحریک پذیری، میگرن، اختلالات خواب، صعبانیت، آکنه، آلوپسی، احساس درد در پستان، کاهش میل جنسی، کیست تخمدان، دردهای شکمی، تهوع، افزایش وزن، خونریزی و/زائیل، ضعف.

عوارض نادر ولی مهم یا تهدید کننده حیات:

دردهای شکمی، آمنی، اضطراب، افزایش اشتغال توجه، عدم تعادل سیستم اعصاب خود مختار، کمر درد، درد استخوان، تحریک پذیری پستان، و/زائیل پستان، اشتغال گردش خون، بوست، درهانیت، اسهال، خشم، خستگی پوست، ادم، بیماری فیبروکیتیک پستان، نفخ شکم، ترشحات سفی، تبان دستگاه گوارش، عدم تحمل گلوتکز، سکینی در ادامه های انتهایی، گرفتگی، تغییرات خلق و خو، اسباسم عضلانی، ایزونیکلاریس، تبش قلب، درد لگن، حساسیت به نور، اختلالات تنفسی، خارش پوست، زورگوش، عفونت مجاری ادراری، کاندیدیای و/زائیل استراغ، خستگی دهانه و/ژان.

آیا می دانید در صورت مشاهده هرگونه عارضه جانبی می توانیاد از پزشک یا داروساز خود بخواهید کارت زرد ADR را برای شما پر کنید؟ (کارت زرد ADR در راستای ارتقاء گزارش دهی عوارض دارویی تهیه شده است)

اندورین -آی اچ چگونه نگهداری می شود:

دارو را دور از دید و دسترسی کودکان نگهداری نمایان.

دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایان.

در طول مدتی که قرص های خود را در مصرف می کنید آنها را در بسته بندی اصلی نگهداری کنید.

از نگهداری دارو در حمام، کنار سینک، پشت پنجره و نیز با گذاشتن آن در خودرو خودداری کنید.

از مصرف دارو پس از تاریخ انقضاء رخ شده بر روی بسته بندی خودداری کنید (تاریخ انقضاء به آخرین روز ماه اعلام شده اشاره دارد).

توصیف محصول:

شکل ظاهری اندورین -آی اچ و نحوه عرضه آن چگونه است:

اندورین -آی اچ به صورت قرص گرد، تخت و خط دار می باشد که در جعبه های ۳۰ عددی (حاوی ۳ بلیستر کارت ۱۰ عددی) همراه با برگه راهنما عرضه می گردد.

نویله کننده: اندورین -آی اچ محصول شرکت داروسازی ایران هورمون می باشد. کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، صندوق پستی ۱۳۱۸۱۵۷۶، تهران، ایران

تلفن صدای مشتری: ۹-۰۵۵۱۷۰۲۴۴۹۰۰۱ داخلی ۳۵۸

تاریخ بازنگری: ۱۳۹۱/۴/۱۶

شرکت داروسازی ایران هورمون

IRAN HORMONE PHARMACEUTICAL Co.

