

راهنمایای های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فحلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو برای موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- وجود حساسیت به استروژن ها و پروژستین ها و مواد دیگر از قبیل ذخاهما، مواد نگهدارنده و رنگ ها، رعایت رژیم غذایی خاص مانند رژیم کم سدیم یا کم شکر، مصرف سیگار یا داشتن اضافه وزن
- در صورت ابتلا به بیماریهایی نظیر: سرخ، بیماری روماتیسمیک، فحلی، بیماریهای سرخرگی، متواسین زن وابسته به سرطان پستان، سابقه افسردگی شدید (به ویژه اگر با ضد بارداری هورمونی ایجاد شده باشد)، هاپیر- پروکتانیشمی، بیماریهای التهابی روده (بیماری کرون)، میگرن، سابقه شخمی یا خانوادگی تری گلیسرید بالا، بالا بودن کلسترول، فاکتورهای خطر ابتلا به ترموبوآمبولی وریدی، بیماری سلول داسی شکل، توده بدون تشخیص پستان، مشکلات قلبی-عروقی، مشکلات کلیوی، ضاهاری های بنیایی، آترو ادم اری کم کاری تیروئید، هایپوگسمی، پانکراتیت، اندومتروزیس، لوپوس اریتماتوز، بیماری کرم
- در صورت مصرف داروهای ضد انعقاد، داروهای ضد دیابت، بنیدودیازپام، هالفا، کندنده های آترومیکیدی (مانند گریزوفلووین و ریغامین)، تاموکسیفن، ضد افسردگیهای سه حلقه ای، آمیدارون، استروئیدهای آنبولیک، آندروژن ها، استروژن ها، آترواستاتین، آسپرین، داروهای ضد عرق (مانند باربیتورات ها، کاربامازپین، فنی توئین)، سیکلوسپورین، توفوپیلی، دی سولافیرام، متورکاتاز، داروهای ضد فشار خون (مانند متیل دوبا)، ناتریوتیکس، پرمیدون، کورتیکواستروئیدها، داروهای درمان HIV (مانند ریتوناویر)، داروهای درمان هیپتاتیک C، لنوتیروزیل، تتراسایکلین، آنتی بیوتیک ها (مانند آمپی سیلین).

این دارو در موارد زیر نباید مصرف شود:

- حساسیت به آنتی آندروژن ها یا استروژن ها یا پروژستین ها یا هر یک از اجزای فرمولاسیون دارو، بارداری یا شک به بارداری، شیردهی، دیابت، مصرف سیگار، اختلال عملکرد شدید کبدی، ابتلا یا سابقه ابتلا به تومورهای کبدی، پورفیریای حاد، بیماری یا سنگ کیسه صفرا، بیماری قلبی مرتبط با فشار خون بالای ریوی یا ریسک آمبولی، اخته خون، سابقه یرقان کلستاتیک یا خارش یا اختلال حرکتی کرم طی بارداری، سابقه سرطان پستان یا رحم یا دهانه رحم، سابقه سندرم اورمیک همولیتیک، میگرن، سابقه شخمی ترموزور وریدی یا سرخرگی یا ترموبوفلیت، درمان اسکروز برای وریدهای واریسی، فاکتورهای خطر شدید یا چندگانه برای بیماری شریانی یا ترموبوآمبولی وریدی، لوپوس اریتماتوز، سیسمیک، حملات ایسمیک مغزی گذرا بدون سردرد، خونریزی وائیتال بدون تشخیص

نکات قابل توجه به هنگام مصرف این دارو:

- قبل از شروع درمان یا این دارو باید احتمال بارداری را رد کرد.
- در ۲۱ روز ابتدای درمان از روش های دیگر پیشگیری از بارداری استفاده نمایید.
- دارو را طبق الگو و در زمان مشخص مصرف نمایید. در طول درمان با این دارو در فواصل مرتب ۱۲- ۶ تا ۹ ماه یا مطابق نظر پزشک در فواصل کمتر به پزشک مراجعه نمایید.
- برای پیشگیری از بروز تهوع یا کاهشی آن، دارو را همراه غذا یا بلافاصله بعد از غذا یا زمان خواب مصرف نمایید.
- بروز هر گونه مشکل در پستان از قبیل توده غیر معمول یا ترشح را به پزشک اطلاع دهید.
- پیش از انجام هر گونه جراحی، درمان اورژانسی یا تست آزمایشگاهی، به پزشک یا دندانپزشک خود درباره مصرف این دارو اطلاع دهید.
- در ۳ ماه ابتدایی مصرف این دارو ممکن است بین دو قاعدگی، مقادیر متفاوتی از خونریزی وائیتال را تجربه کنید. در این صورت به مصرف دارو ادامه دهید اما در صورت شدید بودن خونریزی (مشابه خونریزی ماهانه) پزشک خود را مطلع نمایید.
- مصرف این دارو ممکن است منجر به ایجاد کمزگی قوه ای رنگ به خصوص بر روی صورت (کلاوسما) شود که معمولاً پس از قطع درمان به تدریج ناپدید می شوند. طی درمان، از قرار گرفتن در معرض خورشید و یا لامپ های UV خودداری نموده و در صورت داشتن واکنش شدید یا پزشک مشورت نمایید.

عوارض جانبی:

- هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید؛
- کرامپ شکمی، آفورد (هنگام مصرف)، افسردگی، تغییرات خلق و خو، هجابازی های پستان، ترموزور، تغییرات دهانه رحم، اختلال حرکتی کرم، عدم تحمل زن تماسی، سردرد، اختلال عملکرد کبدی، نوبلایسم کبدی، افزایش فشار خون، تحریک پذیری، کرامپ یا اختلال میل جنسی، تغییر تنبلیوس میلاید، ملایسا، اختلال عاعدگی، تهوع، اختلال وائیتال وائیتال (ولایت و وائیت)، اختلال بنیایی، استفراغ، احتباس ایلعات بدن، واکنش های حساسیت به نور، تغییر اشتها و وزن

مقدار مصرف دارو:

- این دارو در زنان در سن باروری، به عنوان درمان گانه متوسط تا شدید مقاوم به درمان موضعی یا آنتی بیوتیک های خوراکی و هیرسوتیسم کاربرد دارد. مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند. مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر می باشد:

- اولین دوره درمان، از روز اول قاعدگی به مدت ۲۱ روز، هر روز یک قرص مصرف شود، سپس ۷ روز مصرف دارو قطع گردد (در این ۷ روز قاعدگی رخ میدهد)، پس از گذشت ۷ روز، مصرف قرص به همان ترتیب آغاز می گردد در صورتی که عاعدگی در موعد غیر (در مدت ۷ روز) خونجابازی های پستان، ترموزور، تغییرات دهانه رحم، اختلال حرکتی کرم، عدم تحمل زن تماسی، سردرد، اختلال عملکرد کبدی، نوبلایسم کبدی، افزایش فشار خون، تحریک پذیری، کرامپ یا اختلال میل جنسی، تغییر تنبلیوس میلاید، ملایسا، اختلال عاعدگی، تهوع، اختلال وائیتال وائیتال (ولایت و وائیت)، اختلال بنیایی، استفراغ، احتباس ایلعات بدن، واکنش های حساسیت به نور، تغییر اشتها و وزن
- در صورت فراوانی کردن یک نوبت مصرف دارو به این ترتیب عمل کنید. اگر از زمان مصرف ۱۲ ساعت یا کمتر می گذرد، دوز فراوانی شده را مصرف نمایید و مصرف دارو را طبق روال گذشته ادامه دهید. اگر از زمان مصرف قرص بیش از ۱۲ ساعت گذشته باشد، از مصرف آن نوبت خودداری کنید و بقیه را به همان صورت مصرف نمایید و از یک روش ضد بارداری غیر هورمونی (فیزیکی) دیگر نیز استفاده نمایید. در صورت فراوانی بیش از یک دوز یا پزشک یا داروساز با مشورت نمایید.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

