

داروهای گیاهی شامل علف چای (St. John 's Wort)

مقدار و نحوه مصرف مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار تجویز معمول این دارو به قرار زیر است:

۲۵ میلی گرم در روز همراه یا بلافاصله بعد از غذا.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

مشکلات تنفسی: احساس سنگینی بر روی قفسه سینه، گلودرد، سرفه، گرفتگی صدا، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، برونشیت، سینوزیت، سردرد، سرگیجه، درد مفاصلی، کمر درد، شکم درد، علایم شبه آنفلوآنزا، تب، لرز، افزایش تعریق، نفوسایتونی، ادم دست و پا و زانو، افزایش یا کاهش اشتها، اسهال، یبوست، تهوع، استفراغ، سوزش دهان، آبریزش بینی، خارش، مورمور شدن، راش پوستی، یبش شو، اضطراب، افسردگی، ضعف و خستگی، بی خوابی، گر گرفتگی، احتمال شکستگی استخوان، عفونت مجاری ادرار، احساس درد و یا سوزش هنگام دفع ادرار.

در صورت مصرف بیش از حد و یا اتفاقی دارو و بروز مسمومیت سریعاً به مرکز درمانی مراجعه نمایید. علایم مسمومیت دارو عبارتند از: لرز شدید، سرفه، درد چشم، تب، احساس عمومی بیمار بودن، سردرد، گلودرد و احساس خستگی غیر معمول. درمان مسمومیت با دارو به صورت علامتی و حمایتی است و آنتی دوت خاصی ندارد.

شرایط نگهداری:

– دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

– دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

تلفن مدای مشتری: ۱۹-۰۵۵۱۷۴۴۹ داخلی ۳۵۸



اگزیمکس ۲۵

Exemestane

F.C. Tablet

اگزیمکس ۲۵

اگزیمستان

قرص روکش دار

راهنمای های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

– دارو را به اندازه تجویز شده و در زمان درست مصرف کنید و از مصرف دارو بیشتر از مقدار تجویز شده جداً خودداری نمایید.

– دارو را همراه یا بلافاصله بعد از غذا میل نمایید.

– در صورت فراموش کردن مصرف یک نوبت دارو، به محض یادآوری آن را مصرف کنید ولی اگر زمان مصرف نوبت بعدی دارو نزدیک شده باشد آن را مصرف نکنید و از دو برابر کردن دوز دارو در نوبت بعدی خودداری نمایید.

– مراجعه منظم به پزشک معالج جهت بررسی پیشرفت درمان دارویی ضروری است.

– پزشک معالج را از سایر داروهای مصرفی خود مطلع سازید.

موارد منع مصرف:

– در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به دارو و یا سایر مواد جانبی با پزشک خود مشورت کنید.

– این دارو نباید در زمانی که یانسه نشده اند مصرف شود.

– این دارو نباید همزمان با داروهای استروژنی به دلیل تداخلات فارماکولوژیکی مصرف شود.

مصرف در بارداری و شیردهی:

این دارو در زمان یانسه تجویز می شود، بنابراین هیچ گونه مصرفی برای زنان باردار و یا شیرده ندارد. در صورت مصرف اشتباه دارو در دوران بارداری و یا شیردهی، بدلیل عوارض احتمالی بر روی جنین یا نوزاد، حتماً با پزشک مشورت نمایید.

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی ممنوع است.

احتیاطات:

– در صورت ابتلا به نارسایی خفیف تا شدید کلیوی و یا کبدی پزشک معالج را مطلع سازید.

– احتمال افزایش تعداد نفوسیت ها و بروز نفوسایتونی و احتمال افزایش میزان شاخص های عملکردی کبد در نتایج تست های آزمایشگاهی وجود دارد.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف داروهای زیر پزشک خود را مطلع سازید:

کاربامازپین، فنوباربیتال، فنی تونین، ریفامپین، داروهای استروژنی و یا