

Progesterone 25 & 50

پروژسترون ۲۵ و ۵۰

Femogex-IH
25 & 50 mg/1ml

Injectable Solution

فموجکس-آی اچ

۲۵ و ۵۰ میلی گرم در ۱ میلی لیتر

محلول قابل تزریق

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

- این دارو بر حسب نیاز فعلی شما تجویز گردیده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- وجود هر نوع حساسیت به پروژستین‌ها، روغن کنجد، غذاها، مواد محافظ و رنگ‌ها.
- در صورت داشتن هر نوع رژیم غذایی مانند رژیم غذایی کم نمک و یا رژیم غذایی دارای قند پایین.

- در صورت حاملگی و شیردهی.

- در صورت مصرف داروهای زیر:

آمینوگلوکوتنماید، کاربامازپین، فنوباربیتال، فنی توفین، ریفاپوتین و ریفامپین.

- در صورت داشتن سابقه ابتلا به بیماری‌های زیر:

آسم، مرع، مشکلات قلبی، ناراحتی‌های کلیوی، سردردهای میگرنی، خونریزی‌های غیر طبیعی مانند وجود خون در ادرار و یا خونریزی غیر طبیعی از واژن، لخته شدن خون، سکت، واریس وریدها، بیماری‌های پستان، مشکلات سیستم عصبی مرکزی، بالا بودن سطح کلسترول خون، دیابت ملیتوس، بیماری‌های کبدی و بیماری‌هایی که احتمال ابتلا به پوکی استخوان را تشدید می‌کنند.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:

- به علت وجود بنزیل الکل، این دارو نباید در نوزادان نارس یا رسیده بکار رود.

- این دارو را فقط طبق دستور پزشک مصرف نمایید.

- این دارو را در زمان‌های معین مصرف کنید تا عوارض آن کمتر و اثربخشی آن بهتر شود.
- اگر مصرف یک دوز این دارو را فراموش نمودید به محض به یاد آوردن آن را مصرف نمایید ولی چنانچه زمان به یاد آوردن شما هم زمان با مصرف دوز بعدی بود فقط یک دوز مصرف نمایید و از دو برابر نمودن دوز خودداری کنید و بقیه را طبق روال مصرف نمایید.
- در حین مصرف این دارو بهتر است بطور مرتب تحت نظر پزشک باشید تا وضعیت بهبودی شما مورد بررسی قرار گیرد.

- این دارو ممکن است باعث سرگیجه و خواب‌آلودگی شود. لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید.

- چنانچه خونریزی غیر منتظره از واژن برای مدت طولانی رخ داد با پزشک خود مشورت نمایید.
- چنانچه سیکل ماهیانه شما برای مدت ۴۵ روز از آخرین دفعه قاعدگی تکرار نشد با پزشک خود مشورت نمایید.

- چنانچه احتمال می‌دهید به تأخیر افتادن قاعدگی شما به علت بارداری می‌باشد باید فوراً مصرف این دارو را قطع کنید و به پزشک خود اطلاع دهید.

- چنانچه می‌خواهید یک آزمایش طبی انجام دهید مصرف کردن پروژسترون را به پزشک معالج اطلاع دهید.

- در بعضی از بیماران ممکن است این دارو باعث خونریزی از لثه شود بنابراین توصیه

می‌شود که دندان‌هایتان را مرتب مسواک نمایید و لثه‌هایتان را ماساژ دهید.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف صحیح هر دارو را پزشک تعیین می‌کند. ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:

برای کنترل خونریزی غیر معمولی و شدید از رحم و درمان متوقف شدن سیکل ماهیانه، در بزرگسالان و نوجوانان مقدار ۱۰-۵ میلی گرم روزانه به مدت ۱۰-۶ روز.

ممکن است پزشک شما مقدار ۱۵۰-۱۰۰ میلی گرم از این دارو را در یک تک دوز برای شما تجویز نماید.

مصرف در بارداری:

مصرف این دارو در دوران حاملگی توصیه نمی‌شود.

مصرف در شیردهی:

این دارو در شیر مادر ترشح می‌شود ولی اثرات آن بر روی شیر خوار مشخص نشده است.

عوارض جانبی:

هردارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید.

لخته شدن خون، حمله قلبی، سکت، مشکلات کبدی و چشمی، سردرد میگرنی، درد سینه، تغییر در تن صدا، تغییر در بیبایی، کوتاه شدن تنفس، افزایش دفعات خونریزی ماهیانه، افزایش و یا کاهش حجم خون در دوره قاعدگی، توقف سیکل ماهیانه، تکرر ادرار، کاهش اشتها، افسردگی، افزایش ترشح شیر، راش پوستی، تورم صورت و پاها، مشکل در به خواب رفتن، آکنه، کاهش یا افزایش مو، کاهش میل جنسی، سفتی و درد پستان، درد در محل تزریق و کاهش یا افزایش وزن.

شرایط نگهداری:

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری و از یخ‌زدگی محافظت نمایید.

تلفن صدای مشتری: ۱۹-۱۷۰۵۵۵۴۴۹ داخلی ۳۵۸

شرکت داروسازی ایران هورمون
IRAN HORMONE PHARMACEUTICAL Co.

