

پیش از شروع مصرف فیناستراید - آی اچ ۵ هر بار که قرار است مصرف این دارو را تکرار نمایید این برگه راهنما را مطالعه کنید زیرا ممکن است حاوی اطلاعات جدید باشد. این برگه راهنما جایگزین صحبت با پزشک و داروساز در مورد بیماری و یا درمان آن نمی‌باشد.

فیناستراید - آی اچ ۵ چیست و به چه منظور مصرف می‌شود

قرص فیناستراید - آی اچ ۵ (فنی-تازکس- آی اچ) حاوی ماده موثره فیناستراید به میزان ۵ میلی گرم می‌باشد و به گروه دارویی مهارکننده آنزیمی ۵- α الفاردوکتاز تبدیل می‌شود. فیناستراید - آی اچ برای درمان و بهبود علائم هایپرپلازی خوش خیم پروستات استفاده می‌شود.

موارد مصرف تأیید نشده:

- سندرم درد مزمن لگن.
- پرومویی یا هیپوستیم (ایدیوپاتیک) یا منشأ سندرم تخمدان پلی کیستیک) در زنان.

آنچه باید پیش از مصرف فیناستراید - آی اچ ۵ بدانید

فیناستراید - آی اچ ۵ برای درمان فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا تا توصیه به پزشک یا دارویی که در صورتی که علائم شبیه با شما دارند خودداری نمایید.

مواردی که این دارو را نباید مصرف کنید

- اگر به فیناستراید یا سایر ترکیبات رتروکتیو لانسوس حساسیت دارید.

- یا توجه به اثر منفی فیناستراید بر رشد جنین، خانم‌هایی که باردار هستند یا قصد بارداری دارند باید از تماس مستقیم با قرص خود شده یا شکسته شده و مایع منی شریک جنسی خود (که تحت درمان با مهار کننده ۵- α الفاردوکتازها مانند فیناستراید می‌باشد) خودداری نمایند.

- استفاده از قرص فیناستراید - آی اچ ۵ در کودکان توصیه نمی‌شود. نتایج از ایمنی و اثربخشی آن در کودکان ثابت نشده است.

در طول مصرف این دارو باید بدانید

- عفون ادراری و ناتولیت های فیناستراید - آی اچ ۵ در بیماران مبتلا به ناراسایی کلیوی کاهش می‌یابد. در صورتی که مبتلا به ناراسایی کلیوی هستید یا پزشک خود مشورت نمایید.

- قبل از شروع مصرف این دارو برای درمان هایپرپلازی خوش خیم پروستات با پزشک خود درباره دیدن بیماری های اورولوژیکی مشورت کنید.

- اگر تحت درمان با مهار کننده ۵- α الفاردوکتاز هستید، تا حداقل یک ماه پس از آخرین دوز مصرفی دارو نباید خون اهدا کنید. هدف از این فاصله زمانی جلوگیری از انتقال دارو به زنان باردار دریافت کننده خون می‌باشد.

- اگر اختلال عملکرد کبدی دارید یا پزشک خود مشورت نمایید.

- حداقل پس از ۶ ماه از شروع درمان با فیناستراید - آی اچ ۵، سطح سرمی PSA به صورت دوره ای باید بررسی شود زیرا در مبتلایان به سرطان پروستات، فیناستراید - آی اچ ممکن است سبب کاهش سطح سرمی PSA گردد.

- علائم تسکین هایپرپلازی خوش خیم پروستات، شامل بهبود جریان ادرار، کاهش علائم اورولوژیکی دفعه ادرار و تسکین مشکل در ادرار کردن است.

- جهت مشاهده تأثیر کامل دارو، شاید لازم باشد حداقل به مدت ۶ ماه و یا تا پایان عمر مصرف شود. بدون مشورت با پزشک، مصرف قرص فیناستراید - آی اچ را قطع نکنید.

- از آنجایی که فیناستراید - آی اچ، سبب کاهش مشکلات ادراری در مردان مبتلا به هایپرپلازی خوش خیم پروستات می‌گردد، بیماری به هنگام عصر از نوشیدن مایعات، به ویژه قهوه یا الکل خودداری کنید، تا به علت دفع ادرار دچار اختلال در خواب نشوید.

فیناستراید - آی اچ ۵ چگونه مصرف کنید

مقدار مصرف داروی شما را پزشک تعیین می‌کند. تمامی دستورات پزشک یا داروساز خود را با دقت دنبال کنید. این دستورات ممکن است با اطلاعات موجود در این برگه راهنما متفاوت باشد.

چه مقدار مصرف کنید

دوز هایپرپلازی خوش خیم پروستات (BPH): ۵ میلی گرم (یک قرص) یک بار در روز.

دوز تأیید نشده:

- سندرم درد مزمن لگن: ۵ میلی گرم (یک قرص) یک بار در روز.
 - هیپروستیم در زنان: ۲/۵ تا ۵ میلی گرم در روز.
 - تنظیم دوز در ناراسایی کلیوی: تنظیم دوز ضروری نمی‌باشد.
 - تنظیم دوز در اختلالات کبدی: در بیماران با اختلال عملکرد کبدی با احتیاط مصرف شود.
- چطور مصرف کنید.
- قرص به طور کامل بلعیده شود. از جویدن یا خرد کردن قرص بپرهیزید.

چه زمانی مصرف کنید:

این دارو می‌تواند قبل یا بعد از غذا مصرف شود.

برای چه مدت مصرف کنید:

چنانچه قصد دارید مصرف دارو را قطع کنید، از این خصوص با پزشک خود مشورت کنید و مصرف دارو را تا زمان تسکین شدت توسط پزشک خود ادامه دهید.

علاوه بهبود در مدت کوتاهی مشاهده می‌شود ولی معمولاً ۶ ماه درمان، جهت ارزیابی تأثیر دارو مورد نیاز است.

اگر مصرف دارو را فراموش کردید:

اگر مصرف یک دوز را فراموش کردید، بافاصله پس از به یاد آوردن، فقط یک قرص مصرف کنید سپس استفاده از دارو را ادامه دهید. اگر نزدیک به زمان مصرف قرص بعدی رسیده است از مصرف قرص فراموش شده خودداری نموده و استفاده از دارو را مثل قبل ادامه دهید. از مصرف هر زمان دو قرص خودداری نمایید.

اگر دارو را بیش از حد مصرف مصرف کردید:

بافاصله با مرکز اطلاعات دارویی و سموم (DPIC) تماس بگیرید یا به بخش اورژانس نزدیکترین بیمارستان مراجعه کنید.

آیا می‌دانستید ۱۹۰ نفر شاعر مرکز اطلاعات دارویی و سموم در تهران و اکثر شهرستان‌ها می‌باشند؟

یادآوری و بیداری

- این دارو در بارداری، در رده X قرار دارد. در مطالعاتی بر روی تولید مثل حیوانات، در اندام های تناسلی جنسی گاو نر، موارد غیر عادی گزارش شده است.

- مصرف دارو در زمان بارداری یا کسانی که به زودی قصد بارداری دارند، ممنوع است.

- زنان باردار باید از تماس مستقیم با قرص خود شده یا شکسته شده و مایع منی شریک جنسی خود (که در معرض قرار گرفته ۵- α الفاردوکتازها مانند فیناستراید می‌باشد) خودداری نمایند.

- اطلاعاتی در مورد ترشح این دارو در شیر مادر موجود نمی‌باشد. لذا استفاده از این دارو در مادران شیرده ممنوع است.

مصرف چه زمان یا سایر داروها

در صورت مصرف هر گونه داروی دیگر حتی داروهای گیاهی، ویتامین‌ها و مکمل‌های تغذیه‌ای که با نسخه یا بدون نسخه مصرف می‌کنید به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.

عوارض جانبی احتمالی مصرف فیناستراید - آی اچ ۵ چه می‌باشد

هر دارو به عوارض اثر درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود ولی در صورت بروز عوارض زیر، با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

ناتوانی جنسی، کاهش میل جنسی، اختلال در انزال، بزرگ شدن پستان در مردان، گیجی، ادم، راش پوستی، ضعف، کاهش فشار خون وضعیتی، کاهش حجم انزال، خواب آلودگی، تنگی نفس، التهاب مخاط بینی، حساسیت به لمس پستان.

آیا می‌دانستید در صورت مشاهده هر گونه عارضه جانبی می‌توانید از پزشک یا داروساز خود بخواهید کارت زرد ADR را برای شما پر کند؟ (کارت زرد ADR در راستای ارتقاء گزارش دهی عوارض دارویی تهیه شده است)

فیناستراید - آی اچ چگونه نگهداری می‌شود

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.
- تا زمانی که قرص‌های خود را مصرف می‌کنید آن‌ها را در بسته بندی اصلی نگهداری نمایید.
- از نگهداری دارو در حمام، کنار سینک، پشت پنجره و نیز جا گذاشتن آن در خودرو خودداری نمایید.
- از مصرف دارو پس از تاریخ انقضای درج شده بر روی بسته بندی خودداری نمایید.

نویسند محصل

شکل ظاهری فیناستراید - آی اچ ۵ و نحوه عرضه آن چگونه است:

قرص فیناستراید - آی اچ ۵، به صورت آبی رنگ، گرد، محبد و روکش دار می‌باشد که در جعبه های ۳۰ عددی (حاوی ۱۰ پلیستر کارت ۱۰ عددی) همراه با برگه راهنما عرضه می‌گردد.

تولید کننده:

فیناستراید - آی اچ، محصول شرکت داروسازی ایران هورمون می‌باشد.

کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص صنعتی پردیس پستی ۱۳۱۸۵۱۷۶۷، تهران، ایران.

تلفن سدا۱ مشرت۹: ۵۵۱۷۰۰۰۱۷۰۰۰۱۳۴۴۹۸۲۱ (داخلی ۳۵۸)

تاریخ بازنگری:

۱۳۹۹/۵/۱۲

