

فینيازکس - آی اچ ۱

فینيازتريد

قرص روکش دار خوراک حاوی ۱ میلی گرم فینيازتريد

پیش از شروع مصرف فینيازکس- آی اچ و هر بار که قرار است مصرف این دارو را تکرار نمایید این برکه راهنما را مطالعه کنید زیرا ممکن است حاوی اطلاعات جدید باشد. این برکه راهنما جایگزین صحبت با پزشک و داروساز در مورد بیماری و یا درمان آن نمی باشد.

فینيازکس - آی اچ چیست و به چه منظور مصرف می شود

قرص فینيازکس- آی اچ (فی-نازکس- آی اچ) حاوی ماده موثره فینيازتريد به میزان ۱ میلی گرم می باشد و به گروه دارویی مهارکننده آنزیمی ۵- آلفا ردوکتاز تعلق دارد. فینيازکس- آی اچ جهت درمان ریزش مو یا الگوی مردانه (الویسی آندروژنیک، فقط در آقایان استفاده می شود.

آنجی باید پیش از مصرف فینيازکس- آی اچ بداند

فینيازکس- آی اچ برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران حتی در صورتی که علائم شبیه با شما دارند خودداری نمایید.

مواردی که این دارو را نباید مصرف کنید

- اگر به فینيازتريد یا سایر ترکیبات فرمولاسیون حساسیت دارید.
- با توجه به اثر منفی فینيازتريد بر رشد جنین، خانم‌هایی که باردار هستند یا قصد بارداری دارند باید از تماس مستقیم با قرص خود شده یا شکسته شده و مایع منی شریک جنسی خود (که تحت درمان با مهار کننده ۵- آلفا ردوکتازها مانند فینيازتريد می باشد) خودداری نمایند.

- استفاده از قرص فینيازکس- آی اچ در کودکان توصیه نمی شود. نتایج از ایمنی و اثر بخشی آن در کودکان اثبات نشده است.

در طول مصرف این دارو باید بداند

- اثربخشی این دارو برای ریزش مو ناحیه گیجگاه (شقیقه) اثبات نشده است و در خانم‌ها کاربرد ندارد.
- دفع ادراری متوالیت های فینيازکس- آی اچ در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی کاهش می یابد. در صورتی که مبتلا به نارسایی کلیوی هستید با پزشک خود مشورت نمایید.
- اگر تحت درمان با مهار کننده ۵- آلفا ردوکتاز هستید، تا حداقل یک ماه پس از آخرین دوز مصرفی دارو نباید خون اهدا کنید. هدف از این فاصله زمانی جلوگیری از انتقال دارو به زنان باردار دریافت کننده خون می باشد.

- اگر اختلال عملکرد کلیه دارید با پزشک خود مشورت نمایید.
- باید این دارو را حداقل به مدت ۳ ماه استفاده نمایید تا تأثیر آن بر ببینید. اثرات دارو تا زمانی که مصرف دارو ادامه داشته باشد باقی می ماند.

فینيازکس - آی اچ را چگونه مصرف کنید

مقدار مصرف دارو شما را پزشک تعیین می کند. تمامی دستورات پزشک یا داروساز خود را با دقت دنبال کنید. این دستورات ممکن است با اطلاعات موجود در این برکه راهنما متفاوت باشند.

چه مقدار مصرف کنید:

- **الویسی آندروژنیک:** ۱ میلی گرم (یک قرص) یک بار در روز.
- **تنظیم دوز در نارسایی کلیوی:** تنظیم دوز ضروری نمی باشد.
- **تنظیم دوز در اختلالات کبدی:** در بیماران با اختلال عملکرد کبدی با احتیاط مصرف شود.

چطور مصرف کنید:

قرص به طور کامل بلعیده شود. از جویدن یا خرد کردن قرص پرهیزید.

چه زمانی مصرف کنید:

این دارو می تواند قبل یا بعد از غذا مصرف شود.

برای چه مدت مصرف کنید:

چنانچه قصد دارید مصرف دارو را قطع کنید، در این خصوص با پزشک خود مشورت کنید و مصرف دارو را تا زمان تعیین شده توسط پزشک خود ادامه دهید.
جهت مشاهده علائم بهبود بیماری لازم است این دارو هر روز مصرف شود. توصیه می شود برای پایداری ماندن اثرات درمان مصرف دارو ادامه یابد و روند بهبود بیماری هر چند وقت یک بار بررسی شود.

اگر مصرف دارو را فراموش کردید:

اگر مصرف یک دوز را فراموش کردید، بلافاصله پس از به یاد آوردن فقط یک قرص مصرف کنید سپس استفاده از دارو را مثل قبل ادامه دهید. اگر نزدیک به زمان مصرف قرص بعدی رسیده است از مصرف قرص فراموش شده خودداری نموده و استفاده از دارو را مثل قبل ادامه دهید. از مصرف هر زمان دو قرص خودداری نمایید.

اگر دارو را پیش از حد معمول مصرف کردید:

بلافاصله با پزشک یا مرکز اطلاعات دارویی و سموم (DPIC) تماس بگیرید یا به بخش اورژانس نزدیکترین بیمارستان مراجعه کنید.

آیا می دانستید ۱۹۰ شماره تلفن مرکز اطلاعات دارویی و سموم در تهران و اکثر شهرستان‌ها می باشد؟

یادآوری و شریدهی

- این دارو در بارداری، در رده X قرار دارد. در مطالعاتی بر روی تولید مثل حیوانات، اندام های جنسی ناسازگار، گونه های نر، موارد غیر عادی گزارش شده است.

- مصرف دارو در زنان باردار یا کسانی که به زودی قصد بارداری دارند، ممنوع است.
- زنان باردار باید از تماس مستقیم با قرص خود شده یا شکسته شده و مایع منی شریک جنسی خود (که در معرض مهار کننده ۵- آلفا ردوکتازها مانند فینيازتريد می باشد) خودداری نمایند.

- اطلاعاتی در مورد ترشح این دارو در شیر مادر موجود نمی باشد. لذا استفاده از این دارو در مادران شیرده ممنوع است.

مصرف هم زمان با سایر داروها

در صورت مصرف هر گونه داروی دیگر حتی داروهای گیاهی، ویتامین ها و مکمل های تغذیه ای که با نسخه یا بدون نسخه مصرف می کنید به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.

عوارض جانبی احتمالی مصرف فینيازکس- آی اچ چه می باشد

هر بار به موارات اثر درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز شود.
اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز عوارض زیر، با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.
تاخواری جنسی، کاهش میل جنسی، اختلال در انزال، بزرگ شدن پستان در مردان، گیجی، ادم، ابرو پوستی، ضعف، کاهش فشار خون و وضعیتی، کاهش حجم انزال، خواب آلودگی، تنگی نفس، التهاب مخاط بینی، حساسیت به لمس پستان.
آیا می دانستید در صورت مشاهده هر گونه عارضه جانبی می توانید از پزشک یا داروساز خود بخواهید کارت رد زرد ADR را برای شما پر کند؟ (کارت رد زرد ADR در راستای ارتقاء گزارش دهی عوارض دارویی تهیه شده است).

فینيازکس - آی اچ چگونه نگهداری می شود

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.
- تا زمانی که قرص های خود را مصرف می کنید آن‌ها را در بسته بندی اصلی نگهداری نمایید.
- از نگهداری دارو در حمام، کنار سینک، پشت پنجره و نیز جا گذاشتن آن در خودرو خودداری نمایید.
- از مصرف دارو پس از تاریخ انقضای درج شده بر روی بسته بندی خودداری نمایید.

توصیه محصول

شکل ظاهری فینيازکس- آی اچ و نحوه عرضه آن چگونه است:
قرص فینيازکس- آی اچ ۱، به صورت سفید رنگ، گرد، محدب و روکش دار می باشد که درجهی همی ۳۰۰ عددی (حاوی ۲ بیلیستر کارت ۱۰ عددی) همراه با برکه راهنما عرضه می گردد.

تولید کننده:

فینيازکس- آی اچ، محصول شرکت داروسازی ایران هورمون می باشد.
کلیونتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، صندوق پستی ۱۳۱۸۵۱۷۶۷، تهران، ایران.
تلفن صدای مشتری: ۰۹-۵۵۱۷۱۴۹۰+۹۸۲۱۴۹۰ (داخلی ۳۵۸)

تاریخ بازنگری:

۱۳۹۹/۵/۱۲



شرکت داروسازی ایران هورمون
IRAN HORMONE PHARMACEUTICAL Co.