

راهنمایی های عمومی برای مصرف دارو:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران حتی در صورتی که علائم شبیه به شما دارند خودداری فرمایید.

– در صورت ابتلا به هرگونه بیماری به ویژه بیماری قلبی-عروقی، شرایط مستعد کننده به سمیت آنتیلین (مانند نقصان آنزیم G6PD، هموگلوبینوپاتی ام شامل (مت هموگلوبینمیا یا آنمی همولیتیک یا یرقان کلسیاتیک)، مصرف سیگار، اختلال کبدی، قفس یا اختلالات خونی، بیماری های ریوی یا سایر مشکلات تنفسی، سابقه حساسیت به آنتی آندروژن های غیر استروئیدی و هر دارو یا ماده دیگر و تمایل برای بچه دار شدن، به پزشک معالج خود اطلاع دهید.

موارد مصرف:

این دارو در ترکیب با آنالوگ LHRR یا جراحی دوطرفه بیضه، برای درمان سرطان پیشرفته پروستات (سطح B₂ یا C) یا سرطان متاستاتیک پروستات (سطح D₂) مورد استفاده قرار می گیرد.

موارد منع مصرف:

اختلال عملکرد کبدی شدید، حساسیت به فلوتامید یا سایر اجزا، فرمولاسیون، استفاده در زنان (در شرایط غیر تهدید کننده حیات و غیر جدی)، پورفیریای حاد.

مصرف در بارداری و شیردهی:

این دارو در بارداری در رده D قرار دارد و به علت احتمال خطر برای جنین، در صورت صلاحدید پزشک تجویز گردد.

– ترشح این دارو داخل شیر مشخص نیست اما توصیه می شود به علت قابلیت ایجاد خطر در نوزادان و اثرات سمی، نباید طی مصرف این دارو شیردهی انجام شود.

موارد احتیاط:

– طی مصرف این دارو جهت ارزیابی روند درمان و عوارض جانبی، به طور منظم به پزشک مراجعه نمایید.

– تست های عملکرد کبدی و ترانس آمینازهای سرمی باید پیش از شروع درمان، به صورت ماهانه به مدت ۴ ماه و پس از آن به صورت دوره ای ارزیابی شود.

– ایمنی و اثربخشی این دارو در اطفال ثابت نشده است و عوارض جانبی بر تکامل جنسی مردان جوان باید در نظر گرفته شود.

– طی مصرف این دارو از نوشیدن الکل اجتناب نماید.

– آنتی ژن اختصاصی پروستات (PSA) و همچنین غلظت مت هموگلوبین (در بیماران مستعد سمیت آنتیلین) باید ارزیابی شود.

– مصرف فلوتامید در بیماران دارای ALT بیش از ۲ برابر حد نرمال توصیه نمی شود و در صورت افزایش آن به بیش از ۳ برابر حد نرمال یا بروز زردی باید مصرف آن سریعاً متوقف و تا زمان رفع این مشکل تست های عملکرد کبدی پیگیری شود.

– در صورت تجویز دارو در زنان پیش از سن یائسگی، بیمار باید از یک ضد بارداری مناسب استفاده نماید.

– در صورت بروز درد قفسه سینه، تنگی نفس یا دشواری در تنفس و علائم اولیه اختلال عملکرد کبدی (مانند تهوع، استفراغ، درد شکمی، خستگی، بی اشتها، علائم شبه آنفولانزا (سر درد، درد عضله یا مفاصل، خستگی)، افزایش بیلی روبین ادرار (ادرار تیره)، زردی، خارش و حساسیت تحایه یک چهارم راست بالای شکم) سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.

– در صورت استفراغ یا فاصله کمی پس از مصرف این دارو، برای آگاهی از مصرف مجدد یا عدم مصرف قرص به پزشک خود مراجعه نمایید.

– در صورت مصرف داروهای ضد انعقاد خوراکی و یا یکی از داروهای فنی توین یا تتوفیلین به پزشک خود اطلاع دهید.

– در صورت فراموش کردن یک دوز از دارو، به محض یاد آوری آن را مصرف نمایید اما اگر تقریباً زمان مصرف دوز بعدی فرا رسیده است از دو برابر کردن دوز مصرفی اجتناب کرده و مصرف دارو را مطابق قبل ادامه دهید.

– طی درمان با این دارو ممکن است رنگ ادرار به رنگ کهربایی یا سبز مایل به زرد مشاهده شود، این علائم بی ضرر بوده و نیاز به درمان ندارد.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف هرگونه داروی دیگر حتی داروهای گیاهی، ویتامین ها و مکمل های غذایی که با نسخه یا بدون نسخه مصرف می کنید به ویژه هریک از داروهای زیر، به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.

داروهای ضد انعقاد مانند وارفارین، داروهای دارای حاشیه درمانی باریک که با آنزیم CYP450 متابولیزه می شوند (مانند فنی توین و تتوفیلین)، سیپروترون، ایتراکون استات، الفالمپار، کدنده های CYP1A2، داپسون موضعی، دفراسیروکس، ایندینوم 111 کاپرومب پنتادید، پک ایترتروفرن آلفا-2b، پریلوکانین، تیزانیدین.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند. مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:

بزرگسالان: ۵۲۰ میلی گرم (یک قرص)، هر ۸ ساعت و در زمان مشخص.

– این دارو را با معده خالی یا همراه غذا، همراه با یک لیوان آب مصرف نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، ولی در صورت بروز هر عارضه ای به ویژه عوارض زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

– عوارض شایع: تهوع، اسهال، ناتوانی جنسی یا کاهش میل جنسی، گرگرفتگی

– عوارض یا شایع کمتر: کم خونی (خشکی یا ضعف)، تورم صورت، انگشتان پا یا اندام انتهایی، سرفه یا گرفتگی صدا، تب یا لرز، درد پشت یا پهلو، ادرار کردن دردناک یا همراه با سختی، بی حسی یا مور مور شدن یا درد یا ضعف عضله در دست ها یا پاها، راش پوستی، حساسیت به نور، کاهش یا از دست دادن اشتها، درد یا حساسیت پستان، تورم پستان، استفراغ.

– عوارض نادر یا یا شایع نامعلوم: افزایش فشار خون، خارش پوست، افسردگی، اختلالات ریوی، مدفوع سیاه یا قهوه ای، وجود خون در مدفوع یا ادرار، نقاط قرمز رنگ روی پوست، خونریزی یا کبودی غیر معمول، گیجی، سر درد، عصبی بودن، مشکل در به خواب رفتن، ضعف، بروز عفونت (شامل عفونت ریوی و دستگاه تنفسی)، آبی شدن لب ها، ناخن ها و کف دست، سرگیجه شدید یا غش کردن، احساس فشار شدید در سر، ضربان قلب سریع و ضعیف، گرمی و سرخ شدن صورت، احساس عمومی بیماری، احساس نفخ گاز یا سو، هاضمه، یبوست، خشکی دهان، عدم تطبیق چشم به تاریکی.

شرایط نگهداری:

– دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

– دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

– از نگهداری داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

تلفن صدای مشتری: ۹-۱۶۰۵۵۱۴۴۹۰ داخلی ۳۵۸



شرکت داروسازی ایران هورمون
IRAN HORMONE PHARMACEUTICAL Co.