

هیدروکسی پروژسترون کایرات

Hydroxyprogesterone Caproate

Hydrogex-IH

250 mg /1 m

500 mg /2 m

Injectable Solution

هیدروژکس-آی اچ

۲۵۰ میلی گرم در ۱ میلی لیتر

۵۰۰ میلی گرم در ۲ میلی لیتر

محلول قابل تزریق

راهنمایی‌های عمومی برای بیمار:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

در صورت بروز عوارضی مانند: درد، خارش، کیبودی و واکنش های محل تزریق یا عوارضی شامل واکنش های انتهایی، تاروش خون یا مایع و احساس تاریحتی بیش از حد را حتما به پزشک خود اطلاع دهید.

برخشی و به خطر بودن این دارو در کودکان به الیات نرسیده است.

موارد منع مصرف:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

در صورت داشتن سابقه حساسیت به پرولستین ها یا سایر اجزای قرص فرارود، دیابت، صرع، سردیهای میگزنی، آسم، مشکلات قلبی، مشکلات کلیه، اسفردگی، فشار خون بالا بکنی کنترل نشده، تومورهای کبدی خوش خیم یا بدخیم یا بیماری اختلالات تنفسی و بیماری های ستون فقرات، زردی در زمان بارداری، گوزنریزی کبدی فعال، واژیتال، سابقه سرطان پستان یا سینه‌ها و ریه‌ها و آبسه هورمون.

موسسه فرهنگی، هنری و علمی

این دارو در چند مسیر اثر ترشح می‌شود. دارو را از هفته ۳۷ بارداری یا تولد نوزاد قطع نمایند. بسیاری از مطالعات هیچ گونه عوارض جانبی از پروکستین هیدروکلراید برای شیر مادر یا بر روی سلامتی و رشد نوزاد را نشان نمی‌دهند.

این دارو در بارداری در رده B قرار دارد. مطالعات کنترل شده هیچ گونه عوارض جانبی برای مادران زایمانی، شامل اختلالات تناسلی در نوزادان دختر یا پسر در طول مصرف آن را در ۱۰ تا ۱۲ هفته بارداری و در ۱۰ تا ۱۲ هفته بارداری نشان داده است.

مشاوره

اختلالات ترمیمی امبولی: در صورت داشتن سابقه ترمبوز و ریدی عمقی یا شریانی در چند وقت اخیر دارو را قطع ننمایید.

واکنش های آلرژیک: در صورت وقوع واکنش های حساسیتی شامل کفیر، خارش و آنژیئدما در هنگام مصرف دارو، آن را قطع ننمایید.

عدم تحمل گلوکز: پرورسترون ها ممکن است تحمل گلوکز را کاهش دهند لذا میزان گلوکز خون در بیماران دیابت باید مانیتور گردد.

هشدار: در صورت ایجاد رسوب از مصرف آن خودداری شود.

احتیاطات:

بیماران دارای سابقه افسردگی باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند. در صورت عدم بیماری یا سند آسود، مصرف داروی قطع گردد. در صورت بروز علائم مانند از دست دادن توانایی پستی پیوسته کامل و یا جزئی یا بروز توانایی دوبینی، میگرن و بیرون زدن چشم و ضایعات عروقی چشم در طول درمان، مصرف داروی قطع گردد.

نگهداری ایمنی: درهای پروستیتی ممکن است باعث احتباس آب شوند، لذا خانم‌هایی که مستعد (پره کلسیمی، مریخ، میگرن، آسم، اختلالهای کلیوی و...) باشند باید مانتو، گیج و دند.

دستگاه

در صورت استفاده از سایر داروها حتما پزشک خود را مطلع سازید.
در طول درمان با هیدروکسی پروژسترون کاپروات ممکن است غلظت داروهای
متنوعی، کلوزاپین، استامینوفن، هالوتان، نیکوتین، افایرنز، بپروپیون و
متادون، بدن این افراد را متاثر کند.

مقدار: ۵۰۰ میلی لیتر

به شرح ذیل می باشد:

شروع درمان بین هفته ۱۶ و هفته ۲۱ بارداری می‌باشد، ابتدا ۲۵۰ میلی گرم هفته ای ۱ مرتبه عضلانی تجویز می‌گردد. درمان تا هفته ۳۷ بارداری یا تولد نوزاد ادامه می‌یابد.

آمنوره (اولیه و ثانویه) و خونریزی غیرطبیعی رحمی به علت عدم تعادل هورمونی؛ ۳۷/۵ میلی گرم عملیاتی تریزی شود و یا ۲۵ میلی گرم استرادیول پروژسترین پروژسترین سیکل تریزی شود، ۴ هفته بعد ۲۵۰ میلی گرم هیدروکسی پروژسترین بیابرواد و ۵ میلی گرم استرادیول و الرات تریزی گردد، ۴ روز بعد از تخریب بیابرواد و رحم یا اگر خونریزی اتفاق نیفتد ۲۱ روز بعد هیدروکسی پروژسترین بیابرواد به تنهایی تریزی شود. هر ۴ هفته تا ۴ سیکل تریزی می تواند انجام گردد. ترشحات و یبوش یا تب لایال اندومتریت؛

[illegible]

● در صورتی که دوره درمان به صورت سیسیکلی انجام گردد، روز اول سیکل اول، میلی گرم استرادیول و اورات تزریق گردد. ۲ هفته بعد ۲۵۰ میلی گرم هیدروکسی پروژسترون سیسیکلی و ۱۰ میلی گرم استرادیول و اورات تزریق گردد. روز بعد از تخریب دیواره رحم یا اگر خونریزی اتفاق نیفتاد هیدروکسی پروژسترون کایروتات به تنهایی تزریق شود. این برنامه هر ۴ هفته تکرار گردد. زمانی که دیگر باری به درمان نباشد.

- آدنوکارسینوما رحم در مراحل پیشرفته (مرحله ۳ و ۴):
۱۰۰ میلی گرم یا بیشتر (۱ تا ۷ گرم در هفته) بلافاصله به صورت عضلانی و
تا زمانی که بیماری عود می‌کند؛ بعد از ۱۲ هفته که پاسخ لازم ایجاد نشد درمان
قطع می‌گردد.

۲۵ میلی گرم، برای اطمینان ۴ هفته بعد از اولین تزریق تکرار شود.

معارف جانداران:

[illegible]

[بہارِ رابطہ نگہدار](#) :

- دارو را دور از نور و در دمای بین ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.
- دارو را خارج از یخچال نگهداری ننمایید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.
- این دارو را با آب، یکبار مصرف است. بعد از مصرف باقی‌مانده دارو را دور بریزید.

لغز: ۱۹-۵۵۱۷=۴۴۹ داخلی ۳۵۸

تکت دار و سازم ابار هموم

شرکت آرومک ری ایران سورمون

