

کلوتوزکس-آی اچ ۱۰

Kelatozex-IH 10

Ketorolac

F.C. Tablet

کتورولاک

قرص روش دار

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه این در دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- حساسیت به کتورولاک، آسپیرین و سایر داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی.
- ابتلا به بیماری هایی مانند آلوسرپتییک، اختلال عملکرد کلیوی و سابقه ابتلا به خونریزی.
- بارداری و شیردهی.

- در صورت مصرف داروهای مانند ضدانعقادها، آسپیرین یا سایر سالیسیلات ها، داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی، سفالوسپورین ها، لیتیم، متوترکسات، پروبوسید، والپروکسید، اسید، بیس فسفونات ها، کلسیرامین، مهارکننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین، آنتیپلاکوژدها، بتابلورکها، سیکلوسپورین، دیورتیک ها و فنی تونین.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:

- جهت کاهش عوارض گوارشی، دارو را با غذا یا همراه با یک آنتی اسید و با یک لیوان آب میل نمایید، همچنین ۱ تا ۳۰ دقیقه پس از مصرف دارو از دراز کشیدن خودداری نمایید.
- از مصرف دو یا چند داروی ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAIDs) به طور همزمان خودداری نمایید.
- در صورت مشاهده علائمی مانند ادم، خونریزی گوارشی، مشکلات قلبی-عروقی، افزایش وزن غیر عادی و ثورات پوستی سریعا به پزشک خود اطلاع دهید.
- در صورت بروز خستگی و خواب آلودگی از رانندگی و کار با لوازمی که نیاز به هوشیاری دارند پرهیز نمایید.

- داروی کتورولاک را اولسرپتییک فعال، خونریزی اخیر گوارشی، نارسایی پیشرفته کلیه، خونریزی مشکوک یا قهظی مغزی، هموستاز ناقص، یورفیرای هپاتیک و در افراد پر خطر از نظر خونریزی و بیماریانی که به آسپیرین و سایر داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی حساسیت دارند منع مصرف دارد.

این دارو ریسک حمله قلبی را افزایش می دهد لذا در افراد مبتلا به بیماری قلبی باید با احتیاط مصرف شود.

- این دارو به هیچ وجه نباید جهت پیشگیری از درد، قبل از اعمال جراحی استفاده شود.

- از مصرف مشروبات الکلی و آسپیرین در هنگام مصرف این دارو اجتناب نمایید.
- در صورت مشاهده علائم سمیت کبدی مانند تب، خستگی، خارش، سستی، تهوع و درد شکمی به پزشک مراجعه نمایید.

- این دارو در برخی از افراد ممکن است حساسیت به نور ایجاد نماید لذا توصیه می شود در زمان مصرف دارو از ضد آفتاب استفاده شود.

موارد و مقدار مصرف دارو:

- این دارو جهت در مان کوتاه مدت (حداکثر ۵ روز) دردهای نسبتاً شدید حاد کاربرد داشته و در درمان دردهای مزمن و خفیف بکار نمی رود. مصرف خوراکی این دارو معمولاً به دنبال تجویز تزریقی آن صورت می گیرد.

در افراد ۱۶-۶۴ سال

- با وزن بیشتر از ۵۰ کیلو گرم و بدون اختلال کلیوی:
- دوز اولیه ۲۰ میلی گرم می باشد سپس ۱۰ میلی گرم ۴ مرتبه در روز (در فواصل ۴ تا ۶ ساعت) در صورت نیاز تجویز می شود.

- با وزن کمتر از ۵۰ کیلو گرم یا افراد دارای اختلال عملکرد کلیوی:

۱۰ میلی گرم ۴ مرتبه در روز (در فواصل ۴ تا ۶ ساعت) در صورت نیاز تجویز می شود.

حداکثر دوز مصرفی در بزرگسالان ۴۰ میلی گرم در روز می باشد. طول دوره مصرف نباید از ۵ روز تجاوز نماید.

ایمنی و اثر بخشی مصرف این دارو در افراد زیر ۱۶ سال به اثبات نرسیده است.

مصرف در بارداری:

این دارو در بارداری در رده C قرار دارد. بدین معنی که مطالعات انجام گرفته بر روی حیوانات آزمایشگاهی حاکی از تأثیر سو، بر روی جنین است اما مطالعات کافی و کنترل شده در خصوص مصرف این دارو در دوران بارداری در انسان وجود ندارد. بنابراین مصرف این دارو در دوران بارداری بخصوص سه ماهه سوم توصیه نمی شود.

مصرف در شیردهی:

مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی گردد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، اما در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید:

ادم، افزایش یا کاهش فشار خون، ثورات پوستی، زخم لب و دهان، واکنش های آنافیلاکتیک، اتمی، منتریت آسپتییک، آسم، برونکواسپاسم، کوفه شدن تنفس، خونریزی زخم پس از جراحی، مدفوع خونی، اختلال در بینایی، یرقان کلستاتیک، تشنج، انوزیونفلی، درمانیت اکسفولیاتیو، سنکوپ، تب، درد پهلو همراه با بدون وجود خون در ادرار، مشکلات گوارشی، زخم و خونریزی گوارشی، تومور، اختلال شنوایی، اختلالات کبدی، کپهر، بیش فعالی، تکررادرار، افزایش یا کاهش حجم ادرار، لکوپنی، افسردگی، اختلالات کلیوی، خونریزی بینی، پانکراتیت، سایکوز، خونریزی از مقعد، آبریزش بینی، سندرم استیونس جانسون، ترومبوسیتوپنی، وزوز گوش و نگرولیز ایدرمال سمی.

همچنین در صورت تداوم یا بدتر شدن عوارض زیر به پزشک مراجعه نمایید:

درد شکمی، اسهال یا یبوست، خواب آلودگی، سردرد، تهوع، استفراغ، سو، هاضمه و ترمیم زریاد.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

تلفن صدای مشتری: ۰۱۹-۴۴۹۰۵۵۱۷ دایر ۳۵۸

شرکت داروسازی ایران هورمون

IRAN HORMONE PHARMACEUTICAL Co.

