

کتورولاک ۱۵ و ۳۰

Ketorolac 15 & 30

Kelatozex - IH

Injectable Solution

کلتورکس- آی اچ

محلول قابل تزریق

راهنمایی برای مصرف دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو در موارد زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

در صورت ابتلا به سایر بیماری‌ها به ویژه: هر واکنش حساسیتی به عادی به این دارو یا هر دارو و ماده دیگر، بیماری‌های قلبی- عروقی با داشتن فاکتورهای خطر برای این بیماری‌ها، فشار خون بالا، دیابت ملیتوس یا داشتن رژیم کم شیرینی، ادم، مشکلات کبدی/ صفراوی/ کلیوی/ پانکراتیک یا سابقه ابتلا به آنها، سابقه خانوادگی ابتلا به اسهال/ پولیپ های بینی/ سینوزیت مزمن یا کبیر، لئوس ریوماتوز سیستمیک، هموفیلی یا سایر مشکلات خونریزی دهنده، خونریزی مغزی، نوشیدن الکل، مصرف یا سابقه مصرف تیانکو یا سیگار، کولیت، زخم معده یا سایر مشکلات گوارشی، هیپوآلبومین، سپسیس، هپاتیت، انسداد صفرا، از دست دادن بینایی، بارداری، اختلال بافت پیوندی و تصمیم به بارداری.

در صورت مصرف داروهای دیگر به ویژه: ضد انعقادها (مانند وارفارین) یا هپارین یا عوامل ترومبولیتیک (مانند استرپتوکیناز)، دیگلیکوسین، آسپرین یا سایر سالیسیلات‌ها، داروهای ضد التهاب برای استروئیدی (مانند آپوپرفون و دیگلوفاک) داروهای ضد فشار خون یا ادرارآور (مانند فوروزماید)، مهارکننده‌های آنزیم طلا، آنتی‌تانسین، داروهای ضد صرع (فن‌توئین، کاربامازپین)، مکمل‌های پتاسیم، و الپروئیک اسید، ترکیبات طلا، مهارکننده‌های تجمع پلاکتی (مانند کلوپیدوگرل)، پروبنید، لیتیم، متوترکسات، ستودکسی فلیین، استامینوفن، کورتیکواستروئیدها (مانند پردنیزولون)، داروهای ایجاد کننده سمیت کلیوی، ساسپورین ها (سافامندول، سفورازون)، سفوتام، ضد های افسردگی، روانگردان و مهارکننده‌های انتخابی باز جذب سروتونین (برای مثال فلوکستین، تیوتیکسن، آلپرازولام، پاروکستین و سرتراپین)، شل کننده‌های عضلانی، کورتیکوتروپین، مورفین و سیکلوسپورین.

مصرف این دارو در سالمندان با احتیاط صورت پذیرد.

مصرف کتورولاک در موارد زیر منع مصرف دارد:

حساسیت به کتورولاک و تترامین یا سایر ترکیبات فرمولاسیون، آسپرین یا سایر ضد التهاب‌های غیر استروئیدی، ابتلا یا سابقه ابتلا به زخم پپتیک یا کولیت اوسلر یا پرورش یا خونریزی گوارشی، درمان در پیش از جراحی در داشتن پیوند عروق کرونر، نارسایی شدید کنترل شده قلبی، ابتلا به بیماری کبدی یا اختلال پیشرفته کلیوی یا داشتن ریسک نارسایی کلیوی ناشی از کمبود حجم مایعات، مقادیر بالای پتاسیم در خون، جراحی یا ریسک خونریزی بالا و یا داشتن سایر مشکلات خونریزی دهنده، خونریزی مغزی و اختلال آن، هموستاز ناهض، پیچیدگی در پیش از هر جراحی در هر جراحی که هوسولان حیاتی است، درمان زایمان، کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۶ سال، مصرف هم زمان با پروبنید، ستودکسی فلیین یا مصرف اخیر آسپرین یا سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، پولیپ بینی مرتبط به پروتئوساسپاس، سه ماهه سوم بارداری و حجم کم مایعات بدن.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:

این هنگام مراجعه به پزشک، دندانپزشک، داروساز و یا هر درمانگر دیگری، مصرف این دارو را اطلاع دهید، به ویژه اگر قصد انجام جراحی قلبی دارید.

در صورت بروز سرگیجه و خواب آلودگی از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری دارند خودداری نمایید.

مصرف این دارو ممکن است باعث سوء حساسیت بیشتر به نور خورشید یا لایب خورشیدی شود.

از مصرف مشروبات الکلی هنگام مصرف این دارو اجتناب نمایید.

از اختلال کتورولاک و نارکوتیک‌ها مانند مورفین، میریدین، پرومتازین یا هیدروکسی زین در حجم کم (مانند یک سرنگ) پرهیز نمایید.

موارد، مقدار و نحوه مصرف دارو:

کلتورکس- آی اچ در بزرگسالان برای درمان کوتاه مدت (تا ۲۰ روز) درد حاد نسبتاً شدید که نیاز به استفاده از داروهای ضد درد اپیونیدی دارد (عموماً درد پس از جراحی) استفاده می‌شود و برای دردهای خفیف و مزمن کاربرد ندارد.

– بزرگسالان با وزن بیشتر از ۵۰ کیلوگرم:

• ۶ میلی گرم تک دوز بصورت عضلانی عمیق یا ۳۰ میلی گرم به صورت وریدی (حداقل طی مدت ۱۵ ثانیه)، یا هر ۶ ساعت • ۳۰ میلی گرم به صورت عضلانی عمیق یا وریدی (حداقل طی مدت ۱۵ ثانیه) تزریق شود به طوری که روزانه بیش از ۱۲۰ میلی گرم استفاده نگردد.

– بزرگسالان با وزن کمتر از ۵۰ کیلوگرم یا سالمندان یا افراد دارای اختلال عملکرد کلیوی:

• ۳۰ میلی گرم تک دوز به صورت عضلانی عمیق یا ۱۵ میلی گرم به صورت وریدی (حداقل طی مدت ۱۵ ثانیه)، یا هر ۶ ساعت • ۱۵ میلی گرم به صورت عضلانی عمیق یا وریدی (حداقل طی مدت ۱۵ ثانیه) تزریق شود به طوری که روزانه بیش از ۶۰ میلی گرم استفاده نگردد.

– تزریق وریدی باید حداقل طی مدت ۱۵ ثانیه و تزریق عضلانی به صورت عمیق و آهسته انجام پذیرد.

– از تزریق اپیدورال یا اپیتراکتال دارو خودداری نمایید.

مصرف در بارداری:

این دارو در بارداری در رده قرار دارد. **از مصرف این دارو در سه ماهه سوم بارداری اجتناب نماید.**

مصرف در دوران شیردهی:

• مصرف این دارو در دوران شیردهی ممنوع است.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود ولی در صورت بروز هر عارضه‌ای به ویژه عوارض زیر، با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

ادم، افزایش یا کاهش فشار خون، علایم شبه آنفولانزا، زخم یا نقاط سفید روی لب و یا داخل دهان، نقاط قرمز کوچک روی پوست، سوزش (غیر از ناحیه تزریق)، تکرر ادرار، کاهش شنوایی، وزوز گوش، تب همراه با بدون تب از گلو درد، احساس عمومی بیماری، سبکی شدن یا تورم ناحیه پایی، شکم، آتافیلسکی یا واکنش آنافیلاتیک، سوزش/قرمزی/خضیم و پوسته پوسته شدن پوست، درد یا گرفتگی عضله، تورم زبان یا مخاط دهان، تشنگی مداوم، غدد متورم یا دردناک، رتئوسپاتیوپنی، تغییر حالت یا رفتار غیر معمول، بی قراری شدید، آبریزش خونریزی بینی، خونریزی از زخم پس از جراحی، منتریت آسپتیک، برقان کلسانتیک، درد پشت یا پهلو، زخم پپتیک و خونریزی گوارشی و یا پر فشار معده و روده، سرخه یا گرفتگی صدا، مدفوع رنگ پریده، توهم، رنگ پریدگی، خون ادرار چشم، سوزش معده، سبکی کلیوی.

در صورت بروز علایم بالینی اختلال کبدی یا علایم سیستمیک (مانند آنزیموبیلی یا راش پوستی)، کبیر، تورم یا خارش پوست، زرد شدن پوست یا چشم‌ها همراه با بدون خارش، هرگونه تغییر در مقدار یا رنگ ادرار (قرمز یا قهوه ای)، درد یا سختی هنگام دفع ادرار، تورم یا اندام انتهایی، افزایش وزن غیر عادی، ضعف، خواب آلودگی، کاهش اشتها، سر درد، سختی گردن یا پشت، افسردگی، گیجی، تاری دید یا سایر مشکلات بینایی، زخم‌های خونریزی دهنده یا کبیر ای روی لب‌ها، آبی شدن لب و ناخن، تشنج، غش کردن، تنگی نفس و یا وجود مشکلات تنفسی و یا خس خس کردن، تورم، درد شدید معده یا شکم یا پشت، خونریزی از مقعد یا مدفوع تیره یا خونی، استفراغ خونی، بی‌هوشی، اسهال، سرگیجه، سبکی سر، مشکلات شنوایی، سوءهاضمه مزمن، تهوع، استفراغ، تنگی، احساس پری ناحیه شکم، تعریق زیاد، درد یا سنگینی قفسه سینه، ضرابان قلب تند یا نامنظم و گرگرفتگی غیر معمول، مصرف دارو را متوقف و به پزشک مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

– دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

– این محصول به صورت مستقیم استفاده و تمایلی به زرد می‌باشد. در صورت تغییر رنگ یا وجود ذره در آمبول از مصرف آن خودداری نمایید.

– دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

– از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

تلفن خدمات مشتری: ۹-۱۷۰۵۵۱۴۹۰ داخلی ۳۵۸