

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:
- وجود هر نوع حساسیت به لتروزول، غذاها، مواد محافظ و رنگ ها.
- در صورت بارداری و شیردهی.
- در صورت داشتن بیماری های کلیوی و کبدی و ابتلا به استنوپوز.
- در صورت مصرف تاموکسیفن.
- نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:
- این دارو را فقط طبق دستور پزشک مصرف نمایید.
- بهتر است در فواصل زمانی مشخص به پزشک خود مراجعه کنید تا بهبودی شما مورد بررسی قرار گیرد.
- اگر مصرف یک دوز را فراموش نمودید به محض به یاد آوردن، آن را مصرف نمایید ولی در صورتی که زمان به یاد آوردن شما هم زمان با مصرف دوز بعدی بود فقط یک دوز این دارو را مصرف نمایید و از دو برابر نمودن دوز خودداری نموده و بقیه را مطابق با برنامه مصرف نمایید.
- این دارو ممکن است باعث سرگیجه و خواب آلودگی شود، لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید.
- بررسی میزان تراکم استخوانی (BMD) در طول مصرف دارو توصیه می گردد.

#### مقدار مصرف دارو:

- مقدار مصرف صحیح هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:
- درمان سرطان پستان در زنان یائسه: ۲/۵ میلی گرم یک بار در روز.
  - از دیگر موارد مصرف این دارو تحریک تخمک گذاری جهت افزایش احتمال بارداری می باشد که مقدار آن توسط پزشک متخصص تعیین می گردد.
  - مصرف در بارداری و شیردهی:
  - مصرف این دارو در بارداری و شیردهی توصیه نمی شود.

#### عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید.

کوتاه شدن زمان دم و بازدم، درد سینه، عصبی شدن، سرفه، مشکلات ریوی، گیجی، افزایش ضربان قلب، حملات قلبی، اختلالات عروق مغزی، افزایش تعریق، سردرد ناگهانی، از دست دادن تعادل، احساس سرما، تورم پا، افسردگی، خونریزی واژینال، ضعف، حالت تهوع، درد پاها و کشاله ران، ریزش مو، ضعف و بی حسی در پاها و بازو، اختلالات بینایی، ضعف و شکنندگی استخوان ها، ادم محیطی، هایپرانتسیون، عفونت وپروسی، آمبولی ریوی، ترومبو آمبولی، درد عضله و مفاصل، گرگرفتگی.

عوارض زیر ممکن است با ادامه درمان قطع شود با این حال پس از مشاهده این عوارض با پزشک معالج خود مشورت نمایید:

اضطراب، گیجی، یبوست، اسهال، هایپرکلسمی با علایمی مانند (خشکی دهان، سردرد، افزایش ادرار، کاهش اشتها، کاهش وزن و وجود طعم فلزی در دهان)، خواب آلودگی، خستگی غیر معمول، استفراغ، درد معده، اشکال در به خواب رفتن، راش و خارش پوستی، افزایش آنزیم های کبدی و هایپرکلسترولمی.

از عوارض دیگر این دارو می توان به درد تومور، لکوپنی و به ندرت احتمال ابتلا به کارسینومای رحم اشاره نمود.

#### شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- از مصرف داروی تاریخ گذشته اجتناب نمایید.
- دارو را دور از رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

تلفن صدای مشتری: ۱۹-۱۷۰۵۵۱۰۴۴۹۰ داخلی ۳۵۸

شرکت داروسازی ایران هورمون

IRAN HORMONE PHARMACEUTICAL Co.

