

لیدوکائین ۲%

Lidocaine 2%

محلول قابل تزریق

Injectable Solution

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

تجویز این دارو می بایست زیر نظر پزشک صورت گیرد.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک مشورت نمایید:

– حساسیت به هر یک از اجزا، سازنده دارو، مواد محافظ و رنگ ها.
– در صورت مصرف داروهای مانند: بتا بلکرها غیر انتخابی، داروهای تضعیف کننده سیستم عصبی مرکزی، کوکائین، گلیکوزیدهای دیژیتال، هالوپریدول، فنتوتازین ها، ضدافسردگی های سه حلقه ای، اپی نفرین، متوکسامین، فنیل افرین، سایمتیدین، فنی تونین، داروهای ضد ویروس، دیورتیک ها و شل کننده های عضلات.

– در صورت ابتلا به بیماری هایی نظیر آریتمی، نارسایی قلبی، اختلالات انعقادی، هایپر تانسیون، هایپر تیروئیدیسم، عفونت موضعی در محل تزریق، مت هموگلوبینمی، اختلالات سیستم عصبی مرکزی و بیماری های عروق محیطی.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:

– لیدوکائین در بیماران مبتلا به هیپوولمی و بلوک قلبی ممنوعیت مصرف دارد.

– این دارو در افراد مبتلا به نارسایی احتقانی قلب، اختلالات هدایتی قلب، برای کاردی، پور فیبری حاد، شوک شدید، میاستنی گراویس، نارسایی کبدی و کلیوی، مرع و اختلالات تنفسی باید با احتیاط مصرف گردد.

– طی تجویز این دارو، بیمار را از نظر مسمومیت قلبی-عروقی، مسمومیت CNS و وضعیت هوشیاری کنترل کنید.

– در کودکان و افراد مسن، به علت خطر افزایش سمیت سیستمیک، دارو را با احتیاط تجویز نمایید.

موارد و مقدار مصرف دارو:

– آریتمی قلبی

بالغین: ابتدا ۵۰ تا ۱۰۰ میلی گرم (1mg/kg) به صورت یک جا و از طریق وریدی با سرعت ۲۵ تا ۵۰ میلی گرم در دقیقه تجویز می شود و در صورت نیاز بعد از ۵ دقیقه همان دوز تکرار می گردد.

حداکثر دوز دارو ۳۰۰ میلی گرم ($4/5\text{ mg/kg}$) طی ۱ ساعت تجویز می شود. معمولاً پس از تزریق مستقیم وریدی، انفوزیون مداوم وریدی با دوز ۱ تا ۴ میلی گرم در دقیقه به عنوان دوز نگهدارنده صورت می گیرد.

اطفال: ابتدا ۱ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن با سرعت ۲۵ تا ۵۰ میلی گرم در دقیقه به صورت یک جا و از طریق وریدی تزریق می گردد که در صورت نیاز بعد از ۵ دقیقه همان دوز قابل تکرار می باشد. دوز نگهدارنده در اطفال ۲۰ تا ۵۰ میکروگرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن در دقیقه از طریق انفوزیون مداوم وریدی می باشد.

– آنستزی اپیدورال

۳۰۰ تا ۳۰۰ میلی گرم (۱۰ تا ۱۵ میلی لیتر) از محلول ۲%

مصرف در بارداری و شیردهی:

لیدوکائین به سرعت از جفت عبور می نماید. اما از آنجاییکه مطالعات جامع و کنترل شده ای بر روی انسان انجام نگرفته است، لذا توصیه می شود مصرف این دارو در دوران بارداری با نظر پزشک معالج صورت گیرد. همچنین بی خطر بودن مصرف لیدوکائین در مادران شیرده ثابت نشده است.

عوارض جانبی:

شایع ترین عوارض جانبی این دارو مربوط به CNS و دستگاه قلبی-عروقی می باشد.

آمی، درد پشت، برادی کاردی، آریتمی قلبی، درد سینه، بیبوست، ضعف و خستگی، سردرد، افزایش یا کاهش فشار خون، کپیر، هایپوترمی، ناتوانی جنسی، بی اختیاری در دفع ادرار و مدفوع، تهوع، استفراغ، بی حسی، تشنج، راش پوستی، خارش، تاکی کاردی، دیرسیون تنفسی و انقباض عروق محیطی از عوارض این دارو می باشند.

شرایط نگهداری:

دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

تلفن صدای مشتری: ۱۹-۴۴۹۰۵۵۱۷ داخلی ۳۵۸

شرکت داروسازی ایران هورمون

IRAN HORMONE PHARMACEUTICAL Co.

