

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو: این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران جداً خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- وجود هر نوع حساسیت به پروژستین‌ها و موارد دیگر از قبیل غذاها، مواد محافظ و رنگ‌ها.
- در صورت ابتلا به بیماری‌هایی نظیر: ترمبولیتیت، اختلالات حاد کبدی، بیماری‌های عروق مغزی، سابقه ابتلا به بیماری‌های ترمیوآمبولیک، سرطان سینه و خونریزی واژینال یا دلیل نامشخص.
- در صورت مصرف هم‌زمان با داروهای: آمینوگلوکوتنمید، کاربامازپین، فنی‌توین، ریفامپین، آتازانایور، باربیتورات‌ها، کلویازام، گریزینوفلوکلوین، ایتراکونازول، کتوکونازول و فتوباربیتال.

- در صورت بارداری و شیردهی.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:

- این دارو را بیش از مقدار تجویز شده مصرف نکنید و دوره درمان را کامل نمایید.
- به منظور بررسی پیشرفت درمان به طور مرتب با پزشک خود در تماس باشید. همچنین در صورت تأخیر در قاعدگی و یا بروز خونریزی‌های غیر عادی فوراً به پزشک مراجعه نمایید.
- مصرف این دارو ممکن است باعث گیجی شود که ۴-۱ ساعت پس از مصرف دارو ایجاد می‌شود. در صورت رانندگی یا کارهایی که نیاز به هوشیاری دارند این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد.
- در صورت مشکوک شدن به آبستنی مصرف دارو را فوراً قطع کرده و به پزشک مراجعه نمایید.
- در برخی بیماران عوارض مربوط به دندان مانند حساسیت غیر طبیعی لثه‌ها به لمس و فشار، تورم یا خونریزی لثه‌ها دیده می‌شود که در این صورت استفاده از مسواک و نخ دندان و مساج دادن لثه‌ها توصیه می‌شود.

در ضمن برای بررسی وضعیت دندان‌ها به طور منظم به دندانپزشک مراجعه نمایید.

مقدار مصرف دارو:

- مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، ولی مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر می‌باشد:
- درمان آمپوره ثانویه: ۱۰-۵ میلی گرم در روز به مدت ۱۰-۵ روز که از هر زمانی از دوره قاعدگی می‌توان درمان را آغاز نمود.
- برای کنترل خونریزی غیر معمول رحمی ناشی از عدم تعامل هورمونی در شرایطی که بیماری ارگانیکی وجود نداشته باشد: ۱۰-۵ میلی گرم در روز به مدت ۱۰-۵ روز که می‌توان آن را از روز شانزدهم یا بیست و یکم دوره عادت ماهیانه شروع کرد.
- برای ایجاد تغییرات ترشحاتی مطلوب در آندومتر که بوسیله استروژن‌های درون زاد یا بیرون زاد به حد کافی تحریک شده است: مقدار ۱۰ میلی گرم به مدت ۱۰ روز مصرف می‌شود که شروع آن از روز شانزدهم قاعدگی می‌باشد.

- پیشگیری از هایپرپلازی رحمی ناشی از تجویز استروژن در خانم‌های یانسه: به میزان ۱۰-۵ میلی گرم روزانه برای ۱۴-۱۲ روز متوالی در ماه که از روز اول یا شانزدهم قاعدگی آغاز می‌شود.

مصرف در بارداری:

در هنگام مصرف پروژستین‌ها، در صورت بارداری حتماً به پزشک اطلاع دهید. دوز بالای پروژستین‌ها در بارداری باعث ایجاد ناهنجاری مادرزادی می‌گردند.

به طور کلی مصرف مدر و کسپی پروژسترون در طول بارداری توصیه نمی‌گردد و ممنوع است.

مصرف در شیردهی:

اگرچه پروژستین‌ها به داخل شیر مادر ترشح می‌شوند ولی تا کنون گزارشی مبنی بر ایجاد مشکلات در نوزاد مشاهده نشده است. با این وجود، پروژستین‌ها ممکن است باعث تغییرات در کیفیت یا مقدار شیر مادر شوند. بنابراین بهتر است که در دوران شیردهی داروی دیگری مصرف شود و در مورد مصرف این دارو در دوران شیردهی منافع دارو در برابر مضرات آن باید توسط پزشک سنجیده شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود ولیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید.

حساس شدن سینه‌ها، لکه بینی، تغییر در مقدار خونریزی قاعدگی، آمپوره، خونریزی غیر معمول واژینال، گالکتوره، تغییر در وزن، تهوع، اختلال در خواب، تب، افسردگی، ایجاد بثورات جلدی، ادم، یرقان کلاستیک و پرهمی.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

