

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- وجود هر نوع حساسیت به این دارو و هر یک از تیوآمیدها و هم چنین مواد دیگر از قبیل غذاها، مواد محافظ و رنگ ها.

- در صورت ابتلا به نارسایی کبدی.

- در صورت مصرف داروهایی مانند: داروهای ضد انعقاد، آمیودارون، بتابلکرها، تیوفیلین، گلیکوزیدهای دیژیتال، داروهای حاوی ید رادیواکتیو.

- در صورت بارداری و شیردهی.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:

- این دارو را فقط طبق نظر پزشک مصرف نمایید.

- اگر مصرف یک دوز را فراموش نمودهید به محض به یاد آوردن، آن را مصرف نمایید ولی در صورتی که زمان به یاد آوردن شما هم زمان با مصرف دوز بعدی بود فقط یک دوز این دارو را مصرف نمایید و از دو برابر نمودن دوز خودداری نموده و بقیه را مطابق با برنامه مصرف نمایید.

- پیش از قطع مصرف دارو و هم چنین در صورت بروز جراث، عفونت و سایر بیماری ها، به پزشک مراجعه نمایید.

- بهتر است در فواصل زمانی مشخص به پزشک خود مراجعه کنید تا بهبودی شما مورد بررسی قرار گیرد و از قطع ناگهانی دارو بدون مشورت با پزشک

معالجه خودداری نمایید.

- قبل از هر گونه عمل جراحی حتی جراحی های دندان پزشکی، پزشک معالج خود را از مصرف این دارو مطلع نمایید.

- طی درمان با این دارو و پس از قطع آن در صورت نیاز به هر نوع واکسیناسیون یا پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف در بارداری:

این دارو در بارداری، در رده D قرار دارد.

مصرف در شیردهی:

این دارو در شیر ترشح می شود ولی در مطالعات صورت گرفته هیچ اثر بالینی بر روی شیرخوار مشاهده نشده است و در صورت تجویز پزشک

می توان دارو را در دوره شیردهی استفاده کرد.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف صحیح هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:

بزرگسالان: - مقدار دوز شروع در پرکاری خفیف تیروئید روزانه ۱۵ میلی گرم در ۳ دوز منقسم می باشد.

- مقدار دوز شروع در پرکاری نسبتاً شدید تیروئید روزانه ۳۰ تا ۴۰ میلی گرم در ۳ دوز منقسم می باشد.

- مقدار دوز شروع در پرکاری شدید تیروئید روزانه ۶۰ میلی گرم در ۳ دوز منقسم می باشد.

هم چنین مقدار دوز نگهدارنده این دارو ۵ تا ۱۵ میلی گرم روزانه می باشد.

کودکان: مقدار دوز شروع در پرکاری تیروئید روزانه ۰/۴ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در ۳ دوز منقسم می باشد و مقدار دوز نگهدارنده

روزانه ۰/۲ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن در ۳ دوز منقسم می باشد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود

ولیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید.

تب، راش پوستی، خارش، لکونی، آگرانولوسیتوز، نوروپاتی محیطی، درد و التهاب مفاصل، سندرم شبه لوپوس، آتمی آپلاستیک، لنفادنوپاتی،

ترومبوسیتوپنی، یرقان کلستاتیک، بزرگی غدد بزاقی، التهاب کلیه، گیجی، اختلال در حس چشایی، تهوع، استفراغ و درد شکمی.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.