

Mezinox-IH 500

Mesalazine

E.C. Tablet

مزینوکس-آی اچ ۵۰۰

مزالازین

قرص اتریک کوند

راهنمای‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا تومیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- وجود هر نوع حساسیت به مزالازین، سولفاسالازین، سالیسیلات‌ها و مواد دیگر از قبیل غذاها، مواد محافظ و رنگ‌ها
- بارداری و شیردهی
- در صورت مصرف داروهایی مانند ضد التهاب‌های غیراستروئیدی، وارفارین، مرکاپتوپورین، آرتیوپرین و امپرازول
- در صورت ابتلا به نارسایی کلیوی، تنگی پیلور و میوکاردیت
- نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:**

- مصرف دارو را به طور ناگهانی و بدون دستور پزشک قطع ننمایید.
- دوز تجویز شده توسط پزشک را مصرف نموده و از تغییر دادن دوز دارو خودداری فرمایید.
- قرص مزالازین را به طور کامل بلعیده و از شکستن یا جویدن قرص‌ها خودداری نمایید.
- دوره درمان را کامل نمایید و در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو، به محض به یادآوردن آن را مصرف کنید اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.
- در طول درمان، بررسی عملکرد کلیه و آزمایش شمارش سلول‌های خونی (CBC) به صورت دوره‌ای انجام گردد.

- در صورت وقوع اسهال یا خونریزی معده‌ی و یا علائم حساسیت به دارو، درمان متوقف شود.
- مصرف طولانی مدت دارو در موارد نادر می‌تواند منجر به هپاتیت شود.
- بیمار بایستی در طی درمان با این دارو به طور مرتب توسط پزشک معاینه گردد.
- دارو را قبل از وعده‌های غذایی و در هنگام خواب با یک لیوان کامل آب میل نمایید.
- ممکن است سطوح BUN یا کراتینین سرم، ALT، AST، آلکالین فسفاتاز، بیلی روبین، LDH، آمیلاز و لیپاز افزایش یابد.
- اثر بخشی و کارایی دارو در کودکان مشخص نشده است.

مصرف در بارداری:

این دارو در بارداری در رده B قرار دارد. این دارو از جفت عبور می‌نماید و از آنجایی که مطالعات کافی در زمینه اثرات این دارو بر روی جنین انسان صورت نگرفته است لذا مصرف آن در دوران بارداری می‌بایست با نظر پزشک معالج صورت گیرد.

مصرف در شیردهی:

مزالازین و متابولیت آن در شیر ترشح می‌شوند لذا دارو در دوران شیردهی با احتیاط و فقط با نظر پزشک معالج مصرف شود.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو در بزرگسالان در درمان کولیت اولسراتیو حاد و پیشگیری از عود بیماری، ۳- ۱/۵ گرم در روز در دوزهای منقسم می‌باشد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود ولیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید:

ضعف، خستگی، سردرد، بی‌خوابی، اضطراب و بی‌قراری، آکنه، ریزش مو، خارش، راش، تحریق، گهیر، درد شکم، نفخ، یبوست، کرامپ، اسهال، تهوع، استفراغ، بی‌اشتهایی، بدتر شدن کولیت، بادگلو، سو، هاضمه، درد مفاصل، درد پشت، آرتریت، درد عضلات، هایپرتونی، سرفه، فارژیت، آبریزش بینی، درد سینه، لرز، التهاب ملتحمه چشم، دیسمنوره، تب، سندرم شبه آنفلوآنزا، ادم محیطی، درد، پانکراتیت، هپاتیت، میوکاردیت، پری کاردیت، سوزش ادرار، هماجوری، احساس فوریت در دفع ادرار، آگرانولوسیتونی، اختلالات خونی مانند آنمی، ترومبوسیتونی، تشدید آسم و اختلالات ریوی، انوزینوفیلی، سندرم شبه لوپوس، نقرس، خشکی دهان، زخم دهان، اسهال خونی، نوروپاتی محیطی، افسردگی و ناپایداری عواطف.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهدارید.
- دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.
- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

تلفن صدای مشتری: ۰۱۹-۴۴۹۰۵۵۱۷-۴۴۹۰۵۵۱ داخلی ۳۵۸

شرکت داروسازی ایران هورمون
IRAN HORMONE PHARMACEUTICAL CO.

