

ناپرون ناپروکسن

قرص روکش دار ۵۰۰ میلی گرم
قرص اتریک کوته ۵۰۰ میلی گرم

Napron Naproxen

F.C. Tablet 250 mg
E.C. Tablet 500 mg

راه‌نمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای درمان بیماری‌های فکلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری فرمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- سابقه هرگونه واکنش غیر عادی یا حساسیتی نسبت به داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی یا هر ماده دیگر اعم از دارویی، غذایی، مواد محافظ یا رنگ‌ها.
- باریاری و شیردهی.

- ابتلا به بیماری‌هایی نظیر اختلالات خونی، اختلالات گوارشی (کولیت، زخم معده و یا دیگر مشکلات معده ای)، بیماری‌های کلیوی و کبدی، آسم، اسهال، فشار خون بالا، پارکینسون، اختلالات عصبی و اعتیاد به الکل.

مصرف در بارداری:

مصرف این دارو در ۳ ماهه ی سوم بارداری غیر مجاز می باشد. توصیه می شود در ارتباط با مصرف این دارو در دوران بارداری با پزشک معالج مشورت گردد.

مصرف در شیردهی:

مصرف این دارو در دوران شیردهی غیر مجاز می باشد.

هشدارها:

- مصرف در کودکان زیر ۲ سال ممنوع است.
- پس از مصرف این دارو به مدت ۳-۱۵ دقیقه از دراز کشیدن خودداری نمایید.
- قرص ناپروکسن ۵۰۰ میلی گرم اتریک کوته را بلعید و از جویدن آن خودداری کنید و در هنگام مصرف از خوردن یا شستن آن پرهیز نمایید.
- مصرف قرص ناپروکسن ۵۰۰ میلی گرم اتریک کوته برای کودکان غیر مجاز است.

- مصرف این دارو در افراد مبتلا به نارسایی قلبی شدید ممنوع است. - تجویز این دارو در سالمندان به دلیل ریسک آسیب‌های گوارشی باید با احتیاط فراوان انجام شود.

نکات قابل توصیه به هنگام مصرف دارو:

- قبل از اقدام به هر عمل جراحی (از جمله دندانپزشکی) مصرف این دارو را به پزشک مربوطه اطلاع دهید.
- از نوشیدن مشروبات الکلی اجتناب نمایید.

- برای کاهش عوارض گوارشی، دارو را همراه با غذا یا یک لیوان پیرا آب میل نمایید.

- از مصرف بیش از مقدار و مدت توصیه شده توسط پزشک خودداری نمایید.

پزشک خود را مطلع سازید:

- اگر علائم بیماری بهبود نیافته و یا بدتر شود.

- اگر این دارو برای کاهش تب مصرف شود و پس از ۳ روز نتیجه مطلوب حاصل نگردد، و یا اگر ناحیه ی دارای درد دچار قرمزی و تورم شود.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف دارو را پزشک تعیین می کند و میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت است ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:

کنترل درد خفیف تا متوسط در بزرگسالان: قرص ۵۰۰ میلی گرمی هر ۱۲ ساعت و یا قرص ۲۵۰ میلی گرمی هر ۶ الی ۸ ساعت.

اگر مصرف یک دوز را فراموش نمودید به محض به یاد آوردن، آن را مصرف نمایید ولی در صورتی که زمان به یاد آوردن شما هم زمان با مصرف دوز بعدی بود فقط یک دوز این دارو را مصرف نمایید و از دو برابر نمودن دوز خودداری نموده و بقیه را مطابق با برنامه مصرف نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک خود مشورت نمایید. برخی عوارض جانبی که در صورت مشاهده ی آنها، سریعاً باید دارو را قطع نمایید شامل شوک آنافیلاکسی، برنوکسپاسم، استفراغ خونی، خونریزی از بینی بدون علت مشخص، درد سینه، تشنج، سنگوب، خونریزی گوارشی و دیسکرازی خونی می باشد. از عوارض دیگر این دارو می توان اختلال در تکلم، توهم، مننژیت آستیسیک، میگرن، تغییر خلق و خو، نوروپاتی محیطی، آگزوی پوستی، اختلالات گوارشی، سندرم استیونسن جانسون، عفونت های ادراری، آسم، هپاتیت و تب را نام برد.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

تلفن صدای مشتری: ۱۹-۵۵۱۷-۴۴۹۰ داخلی ۳۵۸



شرکت داروسازی ایران هورمون
IRAN HORMONE PHARMACEUTICAL Co.