

ماکساندولین

اکسی متولون

قرص خط دار

Maxandolin

Oxymetholone

Scored Tablet

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- سرطان پروستات یا پستان در آقایان.
- سرطان پستان در خانم‌ها با کلسیم خون بالا.
- دیابت ملیتوس
- بیماری‌های قلبی-عروقی
- نارسایی شدید کبدی
- در صورت بارداری و شیردهی
- وجود هر نوع حساسیت به اکسی متولون.
- در صورت مصرف داروهای آنتی کوآگولانت و داروهای پایین آورنده قند خون.

در هنگام مصرف این دارو رعایت موارد زیر توصیه می‌شود:

- دارو را طبق دستور پزشک مصرف کرده و از مصرف مقادیر بیشتر دارو جداً خودداری نمایید.
- به منظور عدم ناسازگاری دارویی در مورد مصرف هر نوع دارویی با پزشک خود مشورت نمایید.
- برای دستیابی به حداکثر اثر درمانی هنگام مصرف این دارو، استفاده از رژیم غذایی محتوی پروتئین و کالری کافی اهمیت دارد.

- از آنجاییکه پیدایش کیست‌های متعدد پر از خون در کبد (Peliosis hepatis) و ایجاد تومورهای کبدی خوش خیم و وابسته به آن دروزن از عوارض استروئیدهای آنابولیک می‌باشد و اغلب این عوارض تا زمان وخیم شدن بیماری تشخیص داده نمی‌شوند و هم چنین قطع دارو می‌تواند سبب بهبود بیماری گردد لذا پایش دوره‌ای و کامل عملکرد کبدی حین مصرف دارو می‌بایست انجام شود.

- با توجه به اینکه استروئیدهای آنابولیک سبب افزایش LDL، کاهش HDL و در نتیجه افزایش خطر آترواسکلروز می‌گردند لذا در بیماران با سابقه انفارکتوس میوکارد و بیماری‌های عروق کرونر می‌بایست با احتیاط مصرف شوند.

- در صورت مصرف در کودکان، توصیه می‌شود بررسی رشد استخوانی توسط X-ray هر ۶ ماه یک بار انجام شود.

- اندازه گیری کلسترول، آهن خون و ظرفیت اتصال آهن، هموگلوبین و هماتوکریت می‌بایست به صورت دوره ای انجام شود.

- در بیماران مبتلا به سرطان سینه، استروئیدهای آنابولیک ممکن است سبب افزایش کلسیم خون گردند که در این صورت می‌بایست درمان قطع شود.

- از آنجاییکه سالمندان مصرف کننده استروئیدهای آنابولیک در معرض خطر ابتلا به هایپرتروفی پروستات و سرطان پروستات می‌باشند لذا تنظیم دوز در این افراد می‌بایست با احتیاط صورت گیرد.

مصرف در بارداری:

مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع می‌باشد.

مصرف در شیردهی:

از آنجاییکه اطلاعات دقیقی در ارتباط با ورود این دارو به داخل شیر مادر در دسترس نیست مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:

درمان آتمی: بزرگسالان: ۵-۱ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن در روز به صورت خوراکی.

توجه: مقدار موثر دارو ۲-۱ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن در روز به صورت خوراکی می‌باشد اما ممکن است در بعضی از بیماران مقادیر بیشتری لازم باشد.

کودکان: ۱-۱ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز به صورت خوراکی.

در نوزادان نارس و تازه متولد شده دوز دارو بر حسب وزن و سطح بدن آنها توسط پزشک تعیین می‌شود ولی دوز دارو به طور طبیعی ۰/۱۷۵ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن در روز می‌باشد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت شود.

بزرگ شدن آلت تناسلی، کلفت شدن صدا، پرپود نامنظم و افزایش یا کاهش غیرعادی مو در زنان، افزایش تعداد دفعات تعویض و رشد موها در مردان نابالغ، پریاپیسم، تحریک پذیری مثانه، کاهش حجم مایع منی، التهاب اپیدیدیم، ناتوانی جنسی، کاهش اسپرم (نقص در باروری)، آتروفی بیضه در مردان بالغ.

سایر عوارض جانبی عبارتند از: احساس سرما، اسهال، درد و نفخ معده، گرفتگی عضلات، اشکال در به خواب رفتن، افزایش یا کاهش غیرارادی تعابلات جنسی، تحریک پذیری، آکنه، تهوع، استفراغ، بزرگ شدن پستان، آتمی فقر آهن، یرقان کلسیاتیک، نوبلیسم‌های هیپوسلولار، Peliosis hepatis (پیدایش کیست‌های متعدد پر از خون در کبد)، کاهش تحمل گلوکز، ادم، احتباس الکترولیت‌های سرم مانند سدیم و پتاسیم، لرز، بسته شدن زودتر از موعد اپی فیز استخوانی در اطفال و لوسمی در بیماران مبتلا به آتمی آپلاستیک.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

- دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

تلفن صدای مشتری: ۱۹-۰۵۵۱۷-۴۴۹۰۵۵ داخلی ۳۵۸

شرکت داروسازی ایران هورمون
IRAN HORMONE PHARMACEUTICAL Co.

