

رالوکسن

رالوکسیفن هیدروکلراید

Raloxen

Raloxifen Hydrochloride

F.C. Tablet

قرص روکش دار

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:
وجود هر نوع حساسیت به رالوکسیفن، غذاها، مواد محافظ و رنگ ها.

- در صورت مصرف داروهای زیر:

کلستیرامین، استروژن (سیستمیک) و وارفارین.

- در صورت ابتلا به بیماری هایی نظیر:

سابقه ایجاد لخته خونی، سرطان یا تومور و نارسایی احتقانی قلب.

- در صورت بارداری و شیردهی.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:

- مصرف این دارو قبل از یانسیگی توصیه نمی شود.

قبل از هر گونه عمل جراحی مصرف این دارو را به پزشک جراح اطلاع دهید.

- چنانچه قرار است در موقعیتی قرار گیرید که برای یک مدت طولانی مجبور به عدم تحرک باشید مثل عمل جراحی، مسافرت طولانی و استراحت در رختخواب با پزشک خود مشورت نموده و ۷۲ ساعت قبل از جراحی مصرف دارو را قطع نمایید.

- چنانچه در حین مصرف این دارو احساس کردید که باردار شده اید دارو را قطع نموده و با پزشک خود مشورت نمایید. (البته مصرف این دارو فقط در دوران یانسیگی توصیه می گردد.)

- چنانچه در حین مصرف این دارو دچار خونریزی از واژن، درد پستان و تورم دست ها و پاها شدید با پزشک خود مشورت نمایید.

- چنانچه یک دوز دارو را فراموش نمودید از دو برابر نمودن دوز بعدی خودداری نمایید و مانند روال گذشته به مصرف دارو ادامه دهید.

- توصیه می شود جهت دستیابی به پاسخ درمانی بهتر، همراه با رژیم دارویی، مصرف مکمل های حاوی کلسیم و ویتامین د و انجام تمرینات ورزشی مناسب را مورد توجه قرار دهید.

مصرف در بارداری:

مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع است.

مصرف در شیردهی:

مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی شود.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:

- پیشگیری از پوکی استخوان: ۶۰ میلی گرم یک بار در روز.

- درمان پوکی استخوان: ۶۰ میلی گرم یک بار در روز.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت کنید.

درد سینه، عفونت مجاری ادراری، بیماری های رحم، تب و عفونت، سندرم شبه آنفلوآنزا، سینوزیت، فارتژیت، درد عضلانی، ادم محیطی، بثورات پوستی، التهاب واژن، اختلالات گوارشی، لارژتیت، پنومونی، سردردهای میگرنی، اختلالات بینایی و ترومبوآمبولیسم با علایمی مانند سرفه های خون آلود، اختلال در تکلم، عدم حفظ تعادل بدن و کوتاهی تنفس.

عوارضی که در صورت تداوم آنها باید به پزشک مراجعه نمود شامل التهاب و درد مفاصل، دردهای عضلانی، گرگرفتگی، بی خوابی، ترشحات سفید رنگ واژن، افزایش وزن، افسردگی و تعریق می باشند.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

تلفن صدای مشتری: ۹-۱۷۰۵۵۱۴۶۰ داخلی ۳۵۸

شرکت داروسازی ایران هورمون

IRAN HORMONE PHARMACEUTICAL Co.

