

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

– این دارو برای بیماری‌های حاد، شما تجویز گردیده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

– وجود هر نوع حساسیت به کورتیکواستروئیدها و موارد دیگر از قبیل غذا، مواد محافظ و رنگ‌ها.

– در صورت ابتلا به بیماری‌هایی نظیر عفونت‌های موضعی یا سیستمیک، اختلالات دستگاه گوارش، بیماری‌های قلبی-عروقی، نارسایی احتقانی قلب، بیماری‌های کلیوی، دیابت ملیتوس، میاستنی گراویس، اختلالات مربوط به غده تیروئید، بیماری‌های کبدی و بالا بودن کلسترول خون، توبرکلوزیس، آبله مرغان، گلوکوما، لوبوس اریتروماتوزیس.
– در صورت حاملگی و شیردهی.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:

– برای به حداقل رساندن تحریکات گوارشی، این دارو را با غذا مصرف کنید. مصرف هم‌زمان الکل ممکن است سبب افزایش اثرات اولسروژنیک این دارو گردد.

– در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو به ترتیب زیر عمل نمایید:

در صورت مصرف یک روز در میان دارو، اگر صبح همان روز به یاد آوردید دارو را مصرف کنید در غیر این صورت صبح روز بعد دارو را مصرف نمایید.
بنابراین یک روز مصرف دارو حذف می‌شود.

اگر دارو را یک بار در روز مصرف می‌کنید به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید ولی اگر زمان مصرف بعدی فرا رسیده است، دوز بعدی را مصرف کرده و مقدار مصرف را دو برابر ننمایید.

اگر دارو چند بار در روز تجویز شده است، هرچه زودتر آن را مصرف کنید و اگر زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است آن را دو برابر کنید.

– از مصرف بیش از مقدار و مدت توصیه شده توسط پزشک خودداری نمایید.

– به منظور عدم ناسازگاری دارویی در مورد مصرف هر نوع دارویی نسخه ای و بدون نسخه با پزشک معالج خود مشورت نمایید.

– در درمان دراز مدت ممکن است محدودیت مصرف سدیم و کالری و مصرف بیشتر مکمل پتاسیم و پروتئین مورد نیاز باشد.

– در طول درمان با این دارو به طور منظم به پزشک خود مراجعه کنید.

– جهت قطع مصرف دارو به دنبال مصرف طولانی مدت آن توصیه می‌شود که تحت نظر پزشک معالج به صورت دوره ای و به تدریج مقدار مصرف دارو را کم و در نهایت قطع نمود. از قطع ناگهانی مصرف دارو در این موارد جداً خودداری نمایید.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:

– بزرگسالان: ۲۰ تا ۲۴۰ میلی گرم در روز به صورت تک دوز یا منقسم.

– کودکان: بر اساس وزن و سطح بدن آنها توسط پزشک تعیین می‌گردد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک خود مشورت کنید:

شوک آنافیلاکسی، گرگرفتگی صورت و گونه‌ها، پانکراتیت، افزایش اشتها، سو، هاضمه، عصبانیت یا بی‌قراری، اشکال در به خواب رفتن، تیره یا کم‌رنگ شدن پوست، سرگیجه، سردرد، منگی، برافروختگی و درد مفاصل از جمله عوارض این دارو می‌باشند.

عوارض مصرف طولانی مدت دارو:

اختلالات قاعدگی، ضعف عضلانی، پیدایش شیارهایی در پوست، پرمویی، آکنه، زخم گوارشی، نازکی و شکنندگی پوست، پارگی تاندون، افزایش فشار خون، پوکی استخوان، گرد شدن صورت، عدم تعادل آب و الکترولیت، گلوکوم، دیابت ملیتوس، اختلالات روانی، ناپایداری ناگهانی، آریتمی قلبی، مرع، کاهش عملکرد آدرنال، کاتاراکت، سندرم کوشینگ، کاهش رشد (در کودکان)، تأخیر در روند بهبودی زخم، عفونت چشمی.

شرایط نگهداری:

– دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.

– دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

– از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

