

سوفاسین-آی اچ ۵

سولیفناسین

قرص روکش دار

Sofacine-IH 5

Solifenacin

F.C. Tablet

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف دارو:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری فرمایید.

– در صورت بارداری و یا شیردهی، مصرف سایر داروها، سابقه حساسیت به این دارو و یا سایر داروها و مواد جانبی آنها، پزشک معالج خود را مطلع سازید.

– سابقه هر گونه بیماری مخصوصاً مواردی مانند انسداد مثانه و احتباس ادرار، انسداد گوارشی، نارسایی یا مشکلات کبدی، نارسایی یا مشکلات کلیوی، بیماری گلوکوم چشم یا زاویه بسته (پرفشاری چشم) و مشکل طولانی شدن موج QT در الکتروکاردیوگرام (نوار قلبی) را به پزشک معالج خود اطلاع دهید.

– در طول مصرف این دارو و در صورت بروز دردهای شکمی شدید و یا بیوسیت طولانی مدت به مدت ۳ روز و یا بیشتر در اسرع وقت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

مصرف این دارو ممکن است در بعضی افراد موجب مشکلات بینایی شود. پیش از رانندگی و یا فعالیت‌های دیگر از وضوح دید خود اطمینان حاصل کنید.

مصرف این دارو ممکن است در بعضی افراد موجب خشکی دهان شود. در صورت ادامه بروز این مشکل بیش از دو هفته با پزشک و یا دندانپزشک خود مشورت کنید.

موارد منع مصرف:

– در صورت حساسیت به این دارو و یا مواد جانبی آن.

– در صورت انسداد گوارشی.

– در صورت احتباس ادراری.

– در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه بسته چشم که در وضعیت کنترل نشده هستند.

مصرف در بارداری و شیردهی:

در رده C حاملگی قرار دارد و مصرف آن در دوران بارداری توصیه نمی‌شود. در صورت ضرورت مصرف با تشخیص پزشک و ارزیابی فواید مصرف دارو نسبت به خطرات احتمالی آن تجویز می‌شود.

به دلیل فقدان مدارک کافی در مورد میزان ترشح این دارو در شیر مادر مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود. در صورت ضرورت مصرف، پزشک معالج در مورد قطع شیردهی تصمیم‌گیری خواهند نمود.

توصیه می‌شود این دارو در بیماران مبتلا به انسداد راه خروجی مثانه به دلیل خطر احتباس ادرار با احتیاط تجویز شود.

– توصیه می‌شود در بیماران کبدی و نارسایی کلیوی با احتیاط فراوان مصرف شود.

– در صورت کاهش حجم ادرار و یا کاهش حرکات گوارشی هم‌زمان با مصرف این دارو، با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

– در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه بسته چشم با احتیاط تجویز شود.

– کارایی و سلامت مصرف این دارو در کودکان مطالعه و ثابت نشده است.

– در بیماران با سابقه طولانی شدن موج QT قلبی با احتیاط و کنترل، تجویز و مصرف شود.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف داروهای زیر پزشک معالج خود را مطلع سازید:

کتوکوتازول، ایتراکوتازول، کلاریترومایسین، ریفامپین، پتاسیم کلراید.

مقدار و نحوه مصرف مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند ولی مقدار تجویز معمول این دارو به قرار زیر است: جهت کنترل بیش فعالی مثانه بزرگسالان: در شروع درمان به طور معمول یک قرص ۵ میلی گرم یک‌بار در روز توسط پزشک معالج تجویز می‌شود و در صورت نیاز و تحمل بیمار ممکن است مقدار ۱۰ میلی گرم در روز نیز تجویز شود.

– مصرف این دارو به همراه غذا ضرورتی ندارد و فقط توصیه می‌شود که همراه با یک لیوان پر از آب میل نمایید.

در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید به محض به یادآوردن فوراً آن را میل کنید ولی اگر زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد فقط آن نوبت را مصرف نموده و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی از عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه ممکن است همه این عوارض در یک فرد دیده نشود ولیکن در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

بیوسیت، خشکی دهان، تاری دید، سرفه، افسردگی، تحریک پذیری، بی‌اشتهایی، احساس خستگی و کسالت، سرگیجه، خشکی چشم، سو، هاضمه، تورم لب پایین، ضعف، افزایش فشار خون، علایم شبه آنفلوآنزا، تهوع، التهاب حلق، خشکی و درد گلو، بدن درد، آبریزش بینی، تورم غدد بزاق، اختلال در بلع، درد قسمت فوقانی شکم، احتباس ادرار، عفونت مجاری ادرار، درد مثانه، استفراغ.

مسمومیت:

در صورت مصرف بیش از اندازه دارو و بروز مسمومیت سریعاً به مراکز درمانی مراجعه کنید. عوارضی مانند تاری دید، گیجی، منگی، تهوع، استفراغ، بیوسیت، سختی در دفع ادرار، احساس درد در چشم، خشکی چشم، خشکی بینی و دهان و یا گلو، قرمزی و گرگرفتگی صورت، سختی در تنفس، تپش قلب، لرزش، خشکی پوست، سرگیجه، خواب‌آلودگی، ثابت و گشاد شدن مردمک‌ها در شرایط مصرف بیش از اندازه و مسمومیت با دارو مشاهده می‌شوند.

شرایط نگهداری:

– دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

– دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.

– از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

تلفن صدای مشتری: ۰۱۹-۵۵۱۷۰۵۴۴۹۰ داخلی ۳۵۸



شرکت داروسازی ایران‌هورمون
IRAN HORMONE PHARMACEUTICAL Co.