

Tetracosactide L.A.

Synacran

Injectable Suspension

تتراکوزاکتاید آل.آ.

سیناکران

سوسپانسیون تزریقی

موارد مصرف دارو:

این دارو یک استروئید آدرنوکورتیکال است و در موارد متعددی توسط پزشک تجویز و عضلانی تزریق می شود.

راهنمای های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز گردیده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو، وجود هر یک از موارد زیر را به پزشک خود اطلاع دهید:
- سابقه هر نوع حساسیت به این دارو و یا سایر داروها، مواد جانبی داروها، غذاها، رنگ ها و مواد نگهدارنده.

- در صورتی که اخیراً واکسن تزریق کرده باشید و یا در صورت ابتلا به بیماری های ویروسی و یا سایر عفونت ها.

- اگر هر یک از شرایط زیر را دارید، در اسرع وقت پزشک معالج خود را مطلع سازید:

بیماری های شدید قلبی، زخم های فعال گوارشی، دیابت، آسم، پرفشاری خون، مشکلات کلیوی، التهاب گوارشی مانند کولیت، جراحی اخیر روده ای، حوادث ترومبوتیک اخیر، پوکی استخوان، میاستنی گراویس، عفونت های آمیبی، کم کاری غده تیروئید، سیروز کبدی، سل، عفونت های ویروسی چشمی و مریخ.

- در صورت سابقه بیماری های روانی و سایکوز حاد و یا در صورت بروز تغییرات رفتاری و افسردگی حین مصرف دارو مراتب را سریعاً به پزشک خود اطلاع دهید.
- در طی مصرف این دارو از انجام واکسیناسیون بدون نظر پزشک معالج خودداری نمایید.

- تا زمان مشخص شدن تأثیرات مصرف دارو بر بدن شما، از انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری دارند اجتناب نمایید.

- در صورت وقوع حاملگی سریعاً با پزشک خود مشورت نمایید.

- بیماران دیابتی که انسولین مصرف می کنند، درحین مصرف این دارو باید قند خون خود را مرتب کنترل کنند. شاید نیاز باشد مقدار انسولین دریافتی آنها افزایش یابد.

- اثر دارو بر الکترولیت های بدن را می توان با رژیم های حاوی سدیم کم و پتاسیم زیاد کنترل نمود.

- در بیماران با سابقه آلرژی و آسم ممکن است واکنش های شدید حساسیتی ایجاد شود که معمولاً در ۳۰ دقیقه بعد از تزریق دارو اتفاق می افتد. بنابراین در طی این مدت باید مراقبت های پزشکی برای کنترل واکنش های حساسیتی احتمالی انجام شود.

موارد منع مصرف:

- در صورت سابقه حساسیت به این دارو و یا به ACTH .

- در بیماران مبتلا به کوشینگ.

- این دارو در نوزادان نارس و تازه متولد شده به دلیل وجود بنزیل الکل در فرمولاسیون دارو منع مصرف دارد.

مصرف در بارداری و شیردهی:

- مصرف این دارو در دوران حاملگی به دلیل احتمال بروز آثار مضر بر رشد جنین و یا سقط جنین توصیه نمی شود و در صورت ضرورت و با کنترل و ارزیابی فواید دارو به مضرات آن تجویز می شود.

- در دوران شیردهی مصرف این دارو به دلیل نبودن اطلاعات کافی در مورد سلامت مصرف آن در این دوران، توصیه نمی شود و در صورت ضرورت و با ارزیابی فواید مصرف دارو به مضرات احتمالی آن پلایمانع است.

احتیاط مصرف:

در کودکان تا سن ۳ سالگی به دلیل وجود بنزیل الکل در فرمولاسیون دارو، مصرف آن باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.

در صورت وقوع هر یک از موارد زیر با پزشک معالج مشورت نمایید و باید در مصرف دارو احتیاط شود:

- احساس هر گونه درد در معده که ممکن است همراه با استفراغ و تهوع باشد.

- احساس درد در طی حرکت غذا از گلو به معده.

- بروز تشنج و یا درد در چشم و یا بروز مشکلات بینایی و یا درد در قفسه سینه.

- سردرد های شدید و ناگهانی و عدم تعادل در گذار و حرکت.

- کوتاه شدن تنفس و تورم در صورت و لب و زبان و یا سایر بخش های بدن.

- دشواری در دفع ادرار.

- تغییرات شدید و ناگهانی خلقی.

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می نماید، اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح زیر می باشد:

بزرگسالان: شروع درمان با یک میلی گرم عضلانی و روزانه آغاز می شود و در موارد حاد می توان هر ۱۲ ساعت یک میلی گرم تزریق نمود. بعد از فروکش کردن مراحل مصرف معمول دارو به یک میلی گرم عضلانی هر ۲ یا ۳ روز یک بار و حتی مقادیر کمتر تا ۵/۰ میلی گرم هر ۲ یا ۳ روز و یا یک میلی گرم هر هفته، کاهش می یابد.

کودکان کمتر از ۳ سال: به دلیل وجود بنزیل الکل در فرمولاسیون دارو مصرف دارو باید زیر نظر پزشک معالج صورت گیرد.

کودکان ۳ تا ۵ سال: شروع درمان با ۲/۵ تا ۵/۰ میلی گرم عضلانی روزانه آغاز شده و می تواند به همین مقدار دوز نگهدارنده هر ۲ تا ۸ روز ادامه پیدا کند.

کودکان ۵ تا ۱۱ سال: شروع درمان با ۲/۵ تا یک میلی گرم عضلانی روزانه آغاز شده و می تواند به همین مقدار دوز نگهدارنده هر ۲ تا ۸ روز ادامه پیدا کند.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید:

عوارضی که نیاز به توجهات پزشکی دارند مثل: واکنش های حساسیتی (سرگیجه یا منگی، تحریک پذیری، از حال رفتن، حملات تشنجی، بثورات جلدی، اشکال در تنفس، ضربان آهسته و یا غیر عادی قلب، کپیر، تورم لب و زبان و مورت و یا سایر بخش های بدن). عوارضی که در صورت تداوم نیاز به توجه پزشکی دارند:

تب، تهوع و استفراغ، قرمزی و یا درد در محل تزریق، خارش پوست، سردرد، خس خس سینه، دردهای گوارشی، مشکلات ادراری، درد چشم و مشکلات بینایی، در صورت بروز عوارض دیگر می توانید با پزشک خود، داروساز و یا مراکز درمانی تماس بگیرید.

مسمومیت:

در صورت مصرف مقادیر زیاد این دارو علائم سندرم شبه کوشینگ، کاهش تحمل به گلوکز، کاهش پروتئین، برهم خوردن تعادل الکترولیتی، کاهش پتاسیم، ناراحتی های روانی و پوکی استخوان مشاهده می شود.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور، داخل جعبه و درون یخچال (در دمای بین ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد) نگهداری و از یخ زدگی معافقت نمایید.

- دارو را در دسترس کودکان نگهداری نمایید.

تلفن سداي مشرتی: ۰۲۱-۴۴۰۵۵۱۷ تا ۴۴۰۵۵۱۸

شرکت داروسازی ایران هورمون
IRAN HORMONE PHARMACEUTICAL Co.

