

ویراترکس-آی اچ

۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم

والانسیکلوویر

فرم روکش دار

Viratex-IH

500 & 1000 mg

Valacyclovir

F.C. Tablet

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

وجود هر گونه حساسیت نسبت به این دارو و یا سایر مواد جانبی، داروها، غذاها، رنگ ها و مواد نگهدارنده را به پزشک خود اطلاع دهید.

سابقه پیوند مغز استخوان، پیوند کلیوی، بیماری های کلیوی، بیماری های کبدی و ابتلا به بیماری ایدز را به پزشک معالج اطلاع دهید.

موارد منع مصرف:

سابقه حساسیت و یا عدم تحمل این دارو و یا داروی آسیکلوویر.

مصرف در بارداری و شیردهی:

این دارو در رده بارداری قرار دارد ولی از آنجایی که مطالعات کافی و کنترل شده در زنان باردار انجام نشده است، مصرف دارو در دوران بارداری می بایست تحت نظر پزشک معالج و با توجه به مزایای مصرف دارو در برابر خطرات احتمالی آن صورت گیرد.

از آنجایی که در ارتباط با ورود دارو به شیر مادر اطلاعات دقیق در دسترس نیست، لذا مصرف آن در دوران شیردهی می بایست تحت نظر پزشک معالج و با احتیاط انجام شود.

احتیاطات:

• در بیماران با نارسایی کلیوی و بیماران مبتلا به ایدز و بیماران پیوندی و بیماران با وضعیت سیستم ایمنی تضعیف شده و سالمندان، با احتیاط مصرف شده و تنظیم مقدار دارو مورد نیاز می باشد.

• توصیه می شود وی مصرف این دارو مخصوصاً در سالمندان و بیماران کلیوی به اندازه کافی آب و مایعات مصرف شود.

• دوره درمانی را تکمیل نمایید و در صورتی که بعد از چندین روز از مصرف دارو، علائم بهبودی حاصل نشد یا پزشک خود مشورت نمایید.

• از آنجایی که غذا بر روی جذب دارو تأثیری ندارد، می توان دارو را همراه غذا مصرف نمود.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف داروهای زیر پزشک خود را مطلع سازید:

مایکوفنولات، متفیل، پروبنسید، سایمتیدین، مایکوفنولیک اسید.

مقدار و نحوه مصرف مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار تجویز معمول این دارو به شرح زیر می باشد: - درمان تبخال لب (هریس لیپایس) در بزرگسالان: ۲ گرم ۲ بار در روز (هر ۱۲ ساعت) و به مدت یک روز تجویز می شود. درمان می بایست با بروز اولین علائم بیماری مانند خارش، سوزش و ... آغاز شود.

- درمان تبخال تناسلی (هریس ژینیتال) بزرگسالان در اولین ابتلا: ۱ گرم ۴ بار در روز و به مدت ۱۰ روز تجویز می شود.

توصیه می شود درمان حداقل ۴۸ ساعت بعد از بروز علائم و تشخیص بیماری آغاز شود. درمان تبخال تناسلی بزرگسالان در صورت عود مجدد: ۵۰۰ میلی گرم ۴ بار در روز و به مدت ۳ روز تجویز می شود.

بیماران همودیالیز باید داروی خود را بعد از همودیالیز دریافت نمایند.

پیشگیری از تبخال تناسلی عود کننده در بزرگسالان:

• در بیماران با سیستم ایمنی normal ۱ گرم یک بار در روز تجویز می شود.

• در بیماران با تاریخچه ۹ مورد یا کمتر عود مجدد بیماری در سال، ۵۰۰ میلی گرم یک بار در روز تجویز می گردد.

• در بیماران آلوده به ویروس HIV ($CD_4 \geq 100 \text{ cells/mm}^3$) ۵۰۰ میلی گرم دو بار در روز تجویز می شود و جهت کاهش انتقال از شریک جنسی آلوده با تاریخچه ۹ مورد یا کمتر عود بیماری در سال، ۵۰۰ میلی گرم یک بار در روز تجویز می گردد.

- درمان زوتا (هریس زوستر): در سریع ترین زمان ممکن بعد از تشخیص ۱ گرم از دارو ۳ بار در روز به مدت ۷ روز، تجویز می شود.

- درمان آبله مرغان در افراد ۱۲-۲۰ سال:

دوز معمول ۲۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن سه بار در روز به مدت ۵ روز (توصیه می شود درمان با بروز اولین علائم شروع شود).

حداکثر دوز: ۱ گرم سه بار در روز.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولیکن در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

عوارضی که نیاز به توجه بیشتری دارند:

قاعده ای دردناک به همراه اسهال و تهوع شدید، کم خونی آپلاستیک (علائم: درد قفسه سینه، تب و لرز، سرخه، سردرد، کوتاه شدن تنفس)، اختلالات آزمایش های کبدی (علائم: خستگی غیر معمول، زرد شدن رنگ پوست و چشم، علائم شبه آنفلوآنزا)، نارسایی کلیوی (علائم: درد پهلوها و قسمت تحتانی کمر به همراه کاهش حجم و دفعات ادرار)، ترومبوسیتوپنی (علائم: مدفوع سیاه رنگ، درد قفسه سینه، تب و لرز، سرخه) و واکنش های حساسیتی شدید (علائم: افزایش ضربان قلب، ورم صورت، خس خس سینه، سستی تنفس و بلع، خارش و راش پوستی)، آتمی همولیتیک، کاهش سطوح هوشاری در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی، رفتارهای تهاجمی، توهّم، افزایش فشار خون و واکنش های پوستی (مانند اریتم مولتی فرم، حساسیت به نور و راش پوستی).

عوارضی که در صورت تداوم و یا بدتر شدن قابل توجه هستند:

سردرد، تهوع، درد مفاصل، ضعف و گیجی، بیوست، اسهال، بی اشتها، معده درد، استفراغ، اضطراب و بی قراری، خشکی دهان، تحریک پذیری و عصبانیت.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

تلفن صدای مشتری: ۱۹-۰۵۵۱۷۰۴۴۹ داخلی ۳۵۸

شرکت داروسازی ایران هورمون
IRAN HORMONE PHARMACEUTICAL Co.

