

پراسول ۰/۷ و ۰/۱۸

Pramipexole

Scored Tablet

پرامی پکسول

قرص خطدار

راهتمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

– در صورت داشتن سابقه حساسیت به پرامی پکسول، غذاها، رنگ ها و مواد محافظ.

– در صورت مصرف داروهایی مانند لوودوپا، کربی دوپا/ لوودوپا، سایمتیدین، رانیتیدین، دیلتیازم، تریامترن، وراپامیل، هالوپریدول، متوکلوپرامید، کینیدین و کینین.

– در صورت وجود اختلالات نظیر مشکلات چشمی بخصوص در قسمت شبکیه، توهم، هالیوتانسیون و هالیوتانسیون وضعیتی (سرگیجه، گیجی و یا غش کردن بخصوص وقتی شخص از حالت خوابیده یا نشسته به ایستاده در حال تغییر وضعیت است).

– مشکلات کلیوی.

– در صورت مصرف در سالمندان.

نکات قابل توصیه به هنگام مصرف دارو:

دارو را مطابق دستور پزشک مصرف کنید و از قطع مصرف و یا تغییر مقداردارو بدون مشورت با پزشک پرهیزید. پزشک ممکن است در نظر داشته باشد که مقدار داروی مصرفی را پیش از قطع کامل به تدریج کم نماید.

این دارو ممکن است در بعضی افراد سبب خواب آلودگی و یا گیجی گردد و یا موجب بوجود آمدن مشکلات بینایی، ضعف، خستگی و عدم هماهنگی در حرکات عضلات شود. بنابراین از رانندگی یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری دارند بعلت عدم توانایی تطابق و دید نامناسب خودداری نمایید.

– زمانیکه از حالت نشسته به دراز کشیده به حالت ایستاده تغییر وضعیت می دهید ممکن است افت وضعیتی فشار خون رخ دهد لذا توصیه می گردد که به طور ناگهانی از حالت نشسته یا خوابیده به حالت ایستاده تغییر وضعیت ندهید.

– توهومات (دیدن، شنیدن یا احساس چیزهایی که وجود ندارد) در بعضی بیماران به خصوص سالمندان ممکن است مشاهده گردد.

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:

– پارکینسون؛

بزرگسالان: دوز اولیه ۰/۱۲۵ میلی گرم سه بار در روز می باشد که به تدریج مقدار دارو با نظر پزشک و در فواصل ۵ تا ۷ روز افزایش می یابد.

محدوده دوز نگهدارنده ۰/۵ تا ۱/۵ میلی گرم به صورت ۳ بار در روز می باشد. در بیماران دچار اختلال کلیوی مانند سالمندان ممکن است تنظیم دوز دارو نیاز باشد.

– سندرم پاهای بی قرار (Restless Legs Syndrome) :

۰/۱۲۵ میلی گرم یک بار در روز ۲ تا ۳ ساعت پیش از خواب که در صورت نیاز

می توان هر ۴ تا ۷ روز مقدار دوز دارو را تا ۰/۵ میلی گرم روزانه افزایش داد. کودکان؛ اپیمتی و اثربخشی دارو در کودکان به اثبات نرسیده است. در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل نمایید. ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد فقط آن نوبت را مصرف نموده و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.

مصرف در دوران بارداری:

از آنجایی که مطالعات کافی برروی زنان باردار انجام نشده است لذا مصرف این دارو در دوران بارداری تنها در صورت لزوم و با احتیاط فراوان می بایست انجام گیرد.

مصرف در دوران شیردهی:

در ارتباط با ورود این دارو به داخل شیر مادر اطلاعات دقیقی در دسترس نیست لذا توصیه می شود که در صورت مصرف این دارو، شیردهی متوقف گردد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید:

– هالیوتانسیون وضعیتی، دیس کاینزی (پرش ناگهانی و حرکات غیر طبیعی بدن)، توهم، تهوع، گیجی، از دست دادن حافظه، بی خوابی، بی قراری حرکتی، خواب آشفته، اختلال تفکر، اختلالات بینایی، غش کردن (بخصوص در حالت ایستاده)، اختلال در بلع، ادم محیطی، تب، تکرر ادرار، درد عضلات و مفاصل، ضعف عضلانی، رابدومیولیز، تغییرات در خلق و خو، سو، ظن و بدگمانی، پنومونی (سرفه، تنگی نفس)، درد سینه، عفونت ادراری، یبوست، خشکی دهان، بی اشتها، کاهش میل جنسی، افزایش تریعرق، آبریزش بینی، مشکلات پوستی مانند راش و خارش، کاهش وزن، سردرد، خستگی، آتفلوآژا، لرزش، آرتريت.

شرایط نگهداری:

– دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

– دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

– از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

تلفن صدای مشتری: ۰۱۹-۵۵۱۷۰۵۵۱۴۴۹ داخلی ۳۵۸

شرکت داروسازی ایران هورمون
IRAN HORMONE PHARMACEUTICAL Co.

