

والگانسیکلوویر

قرص روکش دار

Valganciclovir

F. C. Tablet

راهنمای های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو بر حسب نیاز فحلی شما تجویز گردیده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

– در صورت ابتلا به بیماری های کلیوی و سطح پایین سلول های خونی، موارد را به پزشک معالج خود اطلاع دهید.

– توصیه می شود در طول مصرف این دارو معاینات مرتب پزشکی، مخصوصاً معاینه چشم و آزمایشات دوره ای خون انجام گیرد.

و وجود هر گونه حساسیت نسبت به این دارو و یا سایر مواد جانبی داروها، غذاها، رنگ ها و مواد نگهدارنده را به پزشک خود اطلاع دهید.

موارد منع مصرف:

در صورت حساسیت به این دارو و یا سابقه حساسیت به گانسیکلوویر یا والگانسیکلوویر.

مصرف در بارداری و شیردهی:

این دارو در بارداری در رده C قرار دارد و مصرف آن در این دوران توصیه نمی شود. در صورت ارجحیت یافتن مزایای مصرف این دارو برای زنان باردار در مقابل خطرات آن، می تواند تحت نظر پزشک تجویز شود.

مصرف این دارو در دوران شیردهی به دلیل بروز عوارض جانبی برای نوزاد توصیه نمی شود. در صورت ضرورت مصرف دارو، پزشک معالج دستورالازام را در مورد قطع شیردهی خواهد داد.

هشدار: این دارو دارای اثرات سمیت خونی، کربنوزنی، ترانژونی و اختلالات باروری است.

احتیاطات:

– در سالمندان، بیماران با نارسایی کلیوی و بیماران که از داروهای نفروتوکسیک استفاده می کنند

– در صورت پایدین بودن سطح نوتروفیل ها، پلاکت ها و هموگلوبین خون و یا سابقه سائیتوپنی در بیمار احتیاط شود.

– در صورت انجام پرتو درمانی و یا مصرف داروهای سرکوب کننده مغز استخوان احتیاط شود.

– در هنگام مصرف این دارو و در صورت بروز علائمی مانند تب و لرز، عفونت غیر عادی، گلو درد، کمر درد یا پهلو درد، سستی در ادرار، مدفوع سیاه رنگ، مشاهده خون در ادرار، خونریزی های غیر عادی و خون مردگی در پوست، پزشک خود را مطلع سازید.

– در طی مصرف این دارو از تماس با بیماران عفونی اجتناب نمایید.

– در طی مصرف این دارو به دلیل حساسیت آندها، مسواک زدن و نخ دندان کشیدن را به آرامی و با احتیاط انجام دهید و از بریدگی پوست نیز جلوگیری کنید.

– قبل از انجام اعمال جراحی و دندانپزشکی، پزشک و دندانپزشک خود را مطلع سازید.

– از تماس پوست و مخاط با قرص های خرد شده و یا شکسته شده اجتناب نمایید و در صورت تماس، پوست خود را با آب و مایون شستشو دهید. در صورت تماس با چشم، با آب شستشو دهید.

– توصیه می شود در طول مصرف این دارو در انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری و تمرکز بالا دارند، احتیاط نمایید.

– توصیه می شود خانم هایی که در سنین باروری قرار دارند، در طی مصرف این دارو و تا ۳۰ روز پس از اتمام دوره مصرف دارو، از روش های جلوگیری از حاملگی موثر استفاده نمایند.

همچنین آگاهی که این دارو را مصرف می نمایند، در طی مصرف این دارو و تا ۹۰ روز بعد از اتمام دوره مصرف، حتماً هنگام مقاربت از کاندوم استفاده نمایند.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف داروهای زیر پزشک خود را مطلع سازید:

دیدانوزین، گانسیکلوویر، مانیکوفولت، فمیتیل، داروهای سرکوب کننده مغز استخوان، داروهای

نفروتوکسیک، پروپنسیک، تری متوپریم، زیدوودین.

مصرف هم زمان این دارو با داروهای اشاره شده در قوی و پرتو درمانی، سرکوب مغز استخوان را تشدید خواهد کرد.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می نماید ولی مقدار تجویز معمول این دارو به قرار زیر است:

– درمان رتینیت سایتموگالوویروس فعال در بزرگسالان: شروع درمان با ۹۰۰ میلی گرم ۳ بار در روز و روز به مدت ۲۱ روز است و دوز نگهدارنده، ۹۰۰ میلی گرم روزی یک بار است.

– پیشگیری از عفونت های سایتموگالوویروس در بیماران پیوندی: ۹۰۰ میلی گرم روزی یک بار و حداکثر تا دهمین روز انجام پیوند، آغاز می شود و تا ۱۰۰ روز ادامه می یابد.

– دارو را همراه غذا میل نمایند تا جذب آن بیشتر شود.

– از شکستن و خرد کردن قرص ها خودداری نمایید.

– دارو را با منظم و طبق دستور پزشک مصرف نمایید و دوره مصرف را کامل کنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولیکن در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

عوارض شایع: آتمی (رنگ پریدگی پوست، سختی تنفس، خستگی غیر معمول)، نوتروپنی (لرز)، سرفه، گرفتگی صدا، کمر درد، پهلو درد، ادرار سخت و دردناک، گلو درد، زخم و جراثیم و یا نقاط سفید در داخل مخاط دهان، خستگی غیر معمول)، ترموبوسیتوپنی (سیاه شدن مدفوع، مشاهده خون در ادرار و مدفوع، لکه های نقطه ای و قرمز پوستی، خونریزی یا خون مردگی غیر عادی)، جدا شدن شکیبه (برق و درخشش در میدان دید، نقطه های قرمز متحرک در چشم)، تب، بیوست، رد پیوند، افزایش فشار خون، لرزش.

عوارض با شیوع کم: خونریزی، کاهش فشار خون، بی قراری، گیجی، تشنج، افسردگی، سرگیجه، خستگی، اختلال در حواس، ضعف، آکنه، درماتیت، خارش، اتساع شکم، در شکم، آسیت، شو، هایپتام، کاهش کالشن کراتینین، سوزش ادرار، مشکلات کلیوی، عفونت مجاری ادراری، آتمی اناواسالاریت، دروسپون مغز استخوان، پان سیوتونی، مشکلات کبدی، واکنش های

ازیاد حساسیت، کاهش میل جنسی، کاهش آب بدن، ادم، افزایش قند خون، هایپرکالمی، هایپو کالسمی، هایپوکسمی، هایپوسیتونی، هایپوسفتمی، ادم محیطی، درد مفاصل، گرفتگی عضلانی، فارتزیت، ناولارتریت، فیوژن هایور، آبریزش بینی، عفونت های موضعی یا سیستمیک یا سپیس، عفونت دستگاه تنفس فوقانی.

ممکن است عوارض دیگری نیز مشاهده شود که نیاز جدی به توجهات پزشکی نداشته و اغلب در ادامه روند مصرف دارو خود بخود رفع می شوند و یا با توصیه های پزشکی قابل برطرف شدن هستند مانند:

شکم درد، اسهال، سردرد، تهوع و استفراغ، بی حسی و سوزش یا درد و یا حس ضعف در دست و پا، یبوابی، گیجی و آشفتگی.

شرایط نگهداری:

– دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

– دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

تلفن مددای مشتری: ۱۹-۱۷۱۰۵۵۱۴۹۰ داخلی ۳۵۸

شرکت داروسازی ایران هورمون
IRAN HORMONE PHARMACEUTICAL Co.

