

Vocozix -IH 200

Voriconazole

F.C. Tablet

وکوزیکس- آی اچ ۲۰۰

وریکونازول

قرص روکش دار

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری فرمایید.

– در صورت وجود سابقه حساسیت به این دارو یا سایر داروها، مواد جانبی داروها، رنگ ها و غذاها، موارد را به پزشک خود اطلاع دهید.

– سابقه پیوند مغز استخوان، مصرف داروهای شیمی درمانی، بیماری های قلبی، کلیوی و کبدی را به پزشک خود اطلاع دهید.

موارد منع مصرف:

استفاده هم زمان وریکونازول با داروهای ترفنادین، آستمیزول، سیزاپراید، پیموزاید، کینیدین، سیرولیموس، ریفاامپین، کاربامازپین، باریتورات های طولانی اثر، دوزهای بالای ریتوناویر و آنکالویدهای ارگوت مانند ارگوتامین و دی هیدروارگوتامین و گیاه علف جای منع مصرف دارد. حساسیت به وریکونازول و یا هر یک از اجزای تشکیل دهنده دارو.

مصرف در بارداری و شیردهی:

این دارو در رده D حاملگی قرار دارد و مصرف آن در این دوران ممنوع است. ممکن است در صورت ضرورت و حیاتی بودن مصرف دارو، با ارزیابی فواید مصرف دارو بر مضرات آن توسط پزشک تجویز شود.

اطلاعات کافی در مورد بی ضرر بودن مصرف این دارو در دوران شیردهی وجود ندارد، بنابراین مصرف آن توصیه نمی شود.

احتیاطات:

– مصرف این دارو در برخی افراد سیب تادی در و درخشش نقطه ای در میدان دید می شود بنابراین توصیه می شود از رانندگی، مخصوصاً در شب و کار با ماشین آلتی که نیاز به بینایی و دقت بالا دارند اجتناب نمایند.

– در صورت مصرف طولانی مدت دارو (بیش از ۲۸ روز) انجام معاینات دوره ای و دقیق چشم توصیه می شود.

– در بیماران قلبی، کبدی و نارسایی کلیوی با احتیاط مصرف شود.

– در طول مصرف این دارو از مواجهه طولانی مدت با نور مستقیم آفتاب پرهیز نمایید.

– استفاده از یک روش موثر مندرجاری برای ختم های در سن باروری الزامی است.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف داروهای زیر پزشک خود را مطلع سازید:

کاربامازپین، فنی توئین، فتورابتال، پیموزاید، سیزاپراید، سایمتیدین، امپرازول، پتوپرازول، ارگوتامین، دی هیدروارگوتامین، متیل ارگوتوئین، کینیدین، افلویرن، ریتوناویر، ریفاامپین، اریترمومایسین، لووآستاتین، آتورواستاتین، سیمواستاتین، نیفیدین، دیلتیازم، وراپامیل، داروهای مخدر، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی یا NSAID ها، گلی بنکالید، پردنیزولون، تاکرولیموس، سیرولیموس، کلویچدورل، وارفارین، سیکلوسپورین، زولپیدم، آپیزارولام، کلونازپام، لورازپام، فلورازپام، میدازولام، اگزازپام، داروهای جلوگیری از بارداری، فلوکونازول، وین بلستین، وین کریستین، آریپیپرازول، ساکسگلپیتین، نوپراپین، اروتینیب، ریوورکسبان، نیلوتینیب، ریفاپوتین، دوستاکسل، نلفیناویر و گیاه علف جای (قطره هایپیران).

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار تجویز معمول این دارو به قرار زیر است:

در بیماران با وزن بیشتر از ۴۰ کیلو گرم درمان به صورت ۲۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت بوده و در صورت عدم پاسخ مناسب، دوز خوراکی تا ۳۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت افزایش می یابد.

– در بیماران با وزن کمتر از ۴۰ کیلو گرم درمان به صورت ۱۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت شروع و در صورت عدم پاسخ مناسب، این دوز تا ۱۵۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت افزایش می یابد.

بیماران باید حداقل تا ۱۴ روز پس از بهبود علایم یا ۱۴ روز بعد از آخرین کشت مثبت درمان شوند.

– مصرف دارو همراه با غذا باعث کاهش میزان جذب آن می شود، بنابراین توصیه می شود دارو را یک ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از غذا مصرف نمایند.

– در صورت فراموش کردن مصرف یک نوبت از دارو به محض یادآوری آن را مصرف نمایید، ولی اگر زمان مصرف بعدی دارو فرا رسیده باشد از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولیکن در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

عوارضی که نیاز به توجه بیشتری دارند:

راش پوستی، زردی، افزایش و یا کاهش فشار خون، افت پتاسیم و منیزیم خون (علایم: گیجی، کاهش حجم ادرار، خشکی دهان، ضربان نامنظم قلب، بی اشتها، درد و گرفتگی عضلات، تهوع و استفراغ، تغییرات خلقی، بی حسی و یا احساس سوزش در دست ها، پاها و لب ها، کوتاه شدن تنفس، خستگی و ضعف غیر عادی)، تغییر در نتایج آزمایش های کبدی، ادم محیطی، افزایش ضربان قلب، کم خونی، قرمز شدن چشم ها، درد چشم، ترومبوسیتوپنی، پان سایتوپنی، لکوپنی، اختلال در نور قلبی (QT prolongation).

عوارضی که در صورت تداوم و یا ایجاد زحمت برای بیمار قابل توجه هستند:

اختلالات بینایی، تب و لرز، تهوع و استفراغ، درد شکمی، اسهال، گیجی، خشکی دهان، سردرد، تومح، کهیر، درد قفسه سینه.

شرایط نگهداری:

– دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

– دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.

تلفن صدای مشتری: ۱۹-۰۵۷۱۵۴۹۰۵ داخلی ۳۵۸

شرکت داروسازی ایران هورمون
IRAN HORMONE PHARMACEUTICAL Co.

