

راهنمایی های عمومی برای مصرف دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
در صورت ابتلا به بیماری های نظیر: ایدز، عفونت های قارچی، عفونت هرپس سیمپلکس، ناراحتی های انگلی، سل، آبله مرغان، دیابت، گلوکوم، زخم معده، کولیت اولسراتیو، بیماری های قلبی، پرفشاری خون، بیماری های کبدی یا کلیوی، کلسترول بالا، پوکی استخوان، لوپوس اریتماتوز و میاستنی گرواویس پزشک خود را مطلع نمایید.

مصرف این دارو را مقاومت در برابر عفونت ها را کاهش می دهد و همچنین می تواند علایم شروع و پیشرفت عفونت ها را پنهان کند، لذا در مصرف طولانی مدت و یا مصرف کوتاه مدت از مقادیر زیاد دارو، از مواجهه با افراد مبتلا به بیماری های عفونی خودداری کنید و در صورت بروز هر نوع علامتی با پزشک خود مشورت نمایید.

موارد منع مصرف:

در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به کورتون ها و یا سایر مواد جانبی داروها با پزشک خود مشورت کنید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در بارداری به ویژه در سه ماهه نخست توصیه نمی شود، در صورت نیاز به مصرف دارو باید فواید درمان با دارو به عوارض احتمالی آن در بارداری توسط پزشک سنجیده شود. این دارو در شیر ترشح می شود بنابراین مصرف آن بویژه در مقادیر زیاد در دوران شیردهی توصیه نمی شود. احتیاطات:

– در طول درمان جهت انجام معاینات به طور منظم به پزشک خود مراجعه نمایید و هرگز بیش از مقدار توصیه شده از دارو مصرف نکنید.

– از قطع ناگهانی دارو بدون اطلاع پزشک خود جدا خودداری نمایید زیرا ممکن است قطع تدریجی دارو لازم باشد.

– در صورت فراموش کردن مصرف دارو: اگر تکلیف شده باشد که دارو را به صورت روزانه و صبح ها مصرف کنید، در اولین زمان ممکن در صبح آن را مصرف نکنید.

– در صورت فراموش کردن مصرف دارو: اگر دارو را در چندین نوبت در روز مصرف می کنید، در اولین زمان ممکن آن را مصرف کنید و اگر زمان مصرف بعدی فرا رسیده باشد آن را دو برابر کنید.

– در صورت مصرف طولانی مدت دارو از پزشک خود در مورد محدودیت مصرف سدیم، افزایش مصرف پروتئین، دریافت کلسیم و ویتامین د و معاینات چشم پزشکی سوال کنید.

– در صورت مصرف طولانی مدت از دارو در موارد انجام تست های پوستی، جراحی ها و درمان های اورژانسی، عفونت های شدید و جراحات های شدید

و انجام واکسیناسیون، کادر درمان از مصرف این دارو مطلع سازید و همچنین از تماس با افراد مبتلا به آبله مرغان و سرخک خودداری نمایید.

– کنترل قند خون در افراد دیابتی طی مصرف دارو توصیه می شود.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف داروهای زیر پزشک خود را مطلع سازید:

ایزونیازید، نارسایی احتقانی قلب، ادم، افزایش فشار خون، سردرد، بی خوابی، بی قراری، تشنج، سرگیجه، افزایش فشار داخل جمجمه ای، اختلالات قنی توئین، ریفامپین، استروژن، واکسن ب ث ژ، پیموزاید، پیمکرولیومیس، آتراکوریوم، پانکرونیوم.

مقدار نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار تجویز معمول این دارو به قرار زیر است:

– بزرگسالان: ۵ تا ۶۰ میلی گرم در روز یکجا و یا در چندین دوز منقسم.

– کودکان: محدوده مصرف بین ۱/۴ میلی گرم تا ۲ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن در یک روز، منقسم در ۳ یا ۴ دوز.

– توصیه می شود جهت کاهش عوارض گوارشی، دارو را همراه غذا یا شیر مصرف نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به وزارت اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه ممکن است همه این عوارض در یک فرد دیده نشود، ولیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

کاردیومیوپاتی، نارسایی احتقانی قلب، ادم، افزایش فشار خون، سردرد، بی خوابی، بی قراری، تشنج، سرگیجه، افزایش فشار داخل جمجمه ای، اختلالات رفتاری، کبودی و یا قرمزی صورت، پرمویی، خونریزی های نقطه ای بسیار ریز پوستی، کهیر، شکنندگی پوست، احتباس سدیم و مایعات، دفع پتاسیم، آکالوز هیپوکالمیک، ضعف عضلانی، بالاس منفی تیروئید، سرکوب محور هیپوفیز آدرنال، زخم های گوارشی، خونریزی های گوارشی، پانکراتیت، اتساع شکم، افزایش اشتها، سو، هاضمه، تهوع، افزایش وزن، افزایش برگشت پذیر مقادیر تست های کبدی، ایزوفالیت، درد، نگرز آسپتیک، شکستگی استخوان، پوکی استخوان، میوپاتی استروئیدی، پارگی تاندون، تأخیر در بهبود زخم ها، افزایش تعریق، تغییر در نتایج تست های پوستی، اختلالات عصبی، سندرم کوئینک، سرکوب رشد در کودکان، عدم پاسخ دهی ثانویه آدرنوکورتیکال بویژه در مواقع استرس را مثل جراحی و بیماری و تروما، کاهش تحمل به گریه و هیدرات ها، بروز دیابت نوع دو، افزایش نیاز به مصرف انسولین و یا داروهای ضد قند خوراکی در بیماران دیابتی، آب مروارید، آگزوفتاموس، ادم پلک، گلوکوم، افزایش فشار داخل چشم، سوزش چشم، خونریزی از بینی.

شرایط نگهداری:

– دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

– دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

– از مصرف دارو های تاریخ گذشته خودداری کنید.

