

داینویژیل-آی اچ

داینویژیل/تینجیل استانداردیل

قرص روشک دارو خوراکی حاوی ۱ میلی گرم داینویژیل/ست/۰/۳ میلی گرم آنتیجیل استانداردیل

پیش از شروع مصرف داینویژیل-آی اچ و هر بار که قرار است مصرف این دارو را تکرار نمایید این برگه راهنما را مطالعه کنید زیرا ممکن است اوضاع اطلاعاتی جدید باشد. این برگه راهنما جایگزین محبت یا پزشک و داروساز در مورد بیماری و یا درمان آن نمی‌باشد.

این دارو چیست و به منظور مصرف می‌شود:

قرص داینویژیل-آی اچ (دانی-تویژیل-آی اچ)، حاوی ماده موثره داینویژست به میزان ۳ میلی‌گرم، متعلق به گروه دارویی پروژسترون‌ها و آنتیجیل استانداردیل به میزان ۰/۳ میلی گرم، متعلق به گروه دارویی استروژن‌ها می باشد.

این دارو برای پیشگیری از بارداری خوراکی و جهت درمان آکنه یا بدمت متوسط در زنانی که داروی ضد بارداری خوراکی در آنها منع مصرف ندارد و یا درمان های موضعی در مورد آن‌ها موثر واقع نشده است، کاربرد دارد.

آنچه که پیش از مصرف داینویژیل-آی اچ بایدانید:

داینویژیل-آی اچ برای بیماری فعلی‌ها نام تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران حتی در صورتی که علائم شبیه به شما دارد خودداری نمایید.

نورادی که این دارو را نباید مصرف کنید:

– اگر به داینویژست یا آنتیجیل استانداردیل یا سایر ترکیبات این دارو حساسیت دارید.

– در صورت ابتلا یا داشتن سابقه تشکیل اخته خود در رگ های پا (تیموژن ویدیجی معنی) یا در ریه ها (آمبولی ریوی).

– در صورت ابتلا یا داشتن سابقه تشکیل اخته خود در شریان ران یا افزایش های دهنده مانند دیابت ملیتوس همراه با آسیب عروقی خون، فشار خون بالا، پروفایل چربی نامناسب (چربی خون بالا).

– در صورتی که مبتلا به بیماری هسیتید کبی یا بدوی ندانن شدن خون تاثیر می‌گذارد، برای مثال، کمبود پروتئین C، کمبود پروتئین S، کمبود آن تیرومبین، یا فاکتور دین و آنتی پادی های ضد فوسفولیپید.

– در صورتی که اخیرا سابقه جراحی داشته اید یا یا قرار است جراحی داشته باشید.

– در صورت داشتن سابقه حمله قلبی، سکته مغزی و یا شرایط مستعد کننده اثرات آترونی و حمله گذرای ایسکمیک مغزی (TIA).

– در صورت ابتلا یا داشتن سابقه بیماری های شدید کبدی، تومورهای کبدی یا پانکراتیت.

– در صورت ابتلا یا داشتن سابقه بیماری همراه با علائم معبی مرکزی.

– در صورت ابتلا یا احتمال ابتلا به سرطان پستان یا سرطان دیواره رحم.

– در صورتی که دچار خونریزی غیر طبیعی وائیتال و یا عدم رخدادهای شده اید.

– در صورت استعمال دخانیات.

در طول مصرف این دارو بایدانید:

– استفاده از داروی داینویژیل-آی اچ پیش از شروع دوره قاعدگی و پس از یاسگی توصیه می شود.

– در صورتی که هر یک از ریسک فاکتورها اشاره شده در زیر را دارید، در کنار طررات اخته‌انداری دارو، مزیای استفاده از داینویژیل-آی اچ نیز باید برای هر بیمار توسط پزشک یا داروساز بررسی و ارزیابی شود.

چاقی (در بیماری که شاخص توده بدنی (BMI) بالاتر از ۳۰ باشد)، گزینی سبالی ۳۵ سال، سابقه خانوادگی بیماری ترومبو-آمبولی ریجی و ترومبو آمبولی شریانی به ویژه در سنین پایین (بمطهر مثال: قبل از ۵۰ سالگی).

– بیماری کرون و کویت آسپروین می تواند به مصرف داروهای ضد بارداری خوراکی تشدید شود.

– اگر سابقه مبتلا به دیابت هسیتید یی مدت مصرف ضدبارداری های خوراکی ترکیبی باید با دقت تحت مراقبت باشد.

– اگر سابقه بیماری وراثتی آرتروپود دارد، مصرف استروژن ممکن است به سبب تحریک یا تشدید نشانه های ادم پوستی گردد.

– اگر تری گلیسرید خون شما بالاست یا سابقه آن را داشته اید، ممکن است با مصرف ضدبارداری های خوراکی ریسک پانکراتیت در شما افزایش یابد.

– اگرچه داینویژیل-آی اچ به منظور جلوگیری از بارداری استفاده می‌شود، ولی این دارو شما را در برابر عفونت‌ها و آلودگی‌ها چسبی محافظت نمی‌دهد. HIV و سایر عفونت‌های جنسی، لازم است از وسایل ضد بارداری دیگری (مانند کاندوم) هم استفاده کنید.

داینویژیل-آی اچ چگونه مصرف کنید:

مقدار مصرف داروی شما را پزشک تعیین می‌کند. تمامی دستورال‌ات پزشک یا داروساز خود را یا دقت دنبال کنید. این دستورات ممکن است با اطلاعات موجود در این برگه راهنما متفاوت باشد.

به مقدار مصرف یکد یک قرص در روز.

چطور مصرف کنید: قرص را به طور کامل با مقدار کمی مایعات بنویسید.

به زمانی مصرف کنید: دارو را در ساعت معینی از روز مصرف نمایید.

برای به مدت مصرف یک روزانه یک قرص در هر ۲۱ روز موثالی استفاده گردد. پس از ۷ آن روز قرص را مصرف نشود و بلافاصله بعد از آن بسته بعدی قرص دارو مصرف می‌نماید. می توان داینویژیل-آی اچ را از روز ۵-۳ روزی قاعدگی آغاز نمود ولی در این صورت در اولین دوره مصرف، توصیه می‌شود در ۷ روز ابتدای استفاده این دارو، از روش ضد بارداری غیر خوراکی دیگر (مانند کاندوم) نیز استفاده شود.

در صورتی که قبلا از داروهای رو ش های ضدبارداری دیگری مثل داروهای ترکیبی دیگر، حلقه وائیتال، پیج پوستی و یا کنتراستپویتی‌های حاوی پروژسترون به تنهایی استفاده می‌گردید، این شروع داینویژیل-آی اچ با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

اگر مصرف دارو را فراموش کردید:

– تأخیر کمتر از ۱۲ ساعت در مصرف هر قرص: اثرات ضدبارداری دارو کاهش نمی‌یابد، بلافاصله پس از به خاطر آوردن، یک قرص را مصرف کنید. سپس استفاده از روش های مثل قیل امل قاعدگی، استفاده نمودن از کاندوم، یا سایر روش‌ها، تا زمانی که قاعدگی شروع نشود. – تأخیر بیش از ۱۲ ساعت در مصرف هر قرص: ضدبارداری قرص کاهش می‌یابد. مدیریت مصرف قرص‌های فراموش شده، می تواند بر اساس توصیه اشاره شده در خیل صورت پذیرد.

– اگر در وقت اول، قرص را فراموش کردید؛ به محض به یاد آوردن قرص فراموش شده آن را مصرف کنید، حتی اگر منجر به مصرف

هم‌زمان دو قرص گردد، سپس استفاده از دارو را مثل قبل ادامه دهید. علاوه بر آن یابستی پی ۷ روز آینده از روش ضدبارداری غیر خوراکی دیگری (مانند کاندوم) استفاده کنید. چنانچه در گذشته، رابطه جنسی داشته‌اید، یابستی احتمال بارداری بررسی شود. – اگر قرص فراموش کردید، به محض به یادآوردن، قرص را فراموش کرده‌اید، یا در مصرف کنید، حتی اگر منجر به مصرف هم‌زمان دو قرص گردد، سپس استفاده از دارو را مثل قبل ادامه دهید. چنانچه در ۷ روز قبل از شروع فراموش شده، دارو را به طور صحیح مصرف کرده‌اید، نیازی به استفاده از سایر روش‌های ضدبارداری در ۷ روز آینده نمی‌باشد. چنانچه مصرف بیش از یک قرص را فراموش کرده‌اید، یابستی به مدت ۷ روز از سایر روش‌های ضدبارداری نیز استفاده کنید.

– اگر در هفته سوم، قرص را فراموش کردید: چنانچه در ۷ روز قبل از خود فراموش شده، دارو را به طور صحیح مصرف کرده اید، نیازی به استفاده از مراقبت‌های ضدبارداری دیگری نمی‌باشد. در این مواقع یکی از دو روش زیر را انتخاب نمایید:

۱- به محض به یاد آوردن، قرص را از مصرف کنید. حتی اگر منجر به مصرف همزمان دو قرص گردد، سپس استفاده از دارو را مثل قبل ادامه دهید. شروع استفاده از قرص بعدی قرص، یابستی بلافاصله پس از اتمام بسته فعلی باشد و هیچ فاصله‌ای در مصرف بسته های قرص نباشد. تا پایان بسته دوم قرص، شما خونریزی نخواهید داشت، اما ممکن است یابستی یا خونریزی های مقطعی در پی روزهای مصرف قرص باشد.

۲- قرص مصرف در بایستمر فعلی را قطع کنید. سپس به مدت ۷ روز قرص مصرف نکنید (روزی که قرص فراموش شده است، نیز شامل این هفت روز می‌باشد). سپس بسته دیگری از قرص را شروع کنید.

– مشکلات گزینی مانند:

ممکن است در صورت مصرف قرص داینویژیل-آی اچ، به دلیل استفرغ یا اسهال شدید کاهش یابد (چنانچه پی ۳-۴ ساعت پس از مصرف قرص رخ دهد). می یابست در سرعت و اسرع وقت جدیدی شروع ورده. قرص جدید باید تا قبل از گذشت ۱۲ ساعت پس از زمان معمول مصرف قرص به یاد آوردن، پس از گذشت ۱۲ ساعت یابستی در خصوص مصرف قرص فراموش شده، مشابه توصیه‌های بالا عمل نمود. چنانچه نمایان به تغییر برنامه مصرف قرص مصرف قرص ندارید، مصرف قرص را از یک بایستمر جدید ادامه دهید.

اگر دارو را بیش از حد معمول مصرف کردید:

بلافاصله با مرکز اطلاعات دارویی و سموم (DPIC) تماس بگیرید یا به بش اوزر اس زمینکری بیمارستان مراجعه کنید. نشانه های مصرف بیش از حد قرص ضدبارداری خوراکی ترکیبی در کودکان و نوجوانان شامل موارد زیر می‌باشد: تهوع، استفراغ، تحریک پذیری زیاد، سردرد، سرگیجه، دردهای شکم، خواب آلودگی، سندرم و خونریزی وائیتال در زنان و دختران، لازم به ذکر است که این اوتی‌ها برای این پستان‌ها خود ندارد و در ممکن با آلودگی ناشی از این بیماری صورت می‌پذیرد.

آیا می دانید ۱۹۰ شماره تلفن مرکز اطلاعات دارویی و سموم در تهران و اکثر شهرستان ها می باشد؟

یاداری و شریدهی:

مصرف قرص داینویژیل-آی اچ، در طول مدت بارداری ممنوع می باشد. قبل از شروع درمان با قرص داینویژیل-آی اچ، یابستی احتمال بارداری در روز دارید. اگر در طول مدت مصرف قرص داینویژیل-آی اچ بارداری رخ دهد، مصرف قرص داینویژیل-آی اچ یابستی سریعاً قطع شود. داروهای ضدبارداری خوراکی ترکیبی ممکن است در دوران شیردهی موجب کاهش مقدار و تغییر ترکیبات شیر، ممکن است نظایر کمی از استروئیدهای ضدبارداری و یا متابولیت های آن در شیر مادر ترشح شود. بنابراین به طور کلی مصرف قرص ضدبارداری خوراکی ترکیبی تا زمانیکه درختنداری را کامل از شیر بگیریذ، توصیه نمی‌شود.

مصرف همزمان با سایر داروها:

– در صورت مصرف هر گونه دارو دیگر حتی داروهای گیاهی، ویتامین ها و مکمل های غذایی که با نسخه یا بدون نسخه مصرف می‌کنید به پزشک یا هر زمان این اطلاع دهید.

– علانی از داخل مصرف هم زمان این داروهای اشاره شده در زیر دیده شده است:

بایسیتورهای دارو، بوستانات، کاربامازپین، تی توبین، پریسیمدین، رفامپیسین، ریتوناویر، نوراپین، افایویر، تی فامیات، گزینوفلوویرین، اکس اکتازولاز، تیوبرامات، آمیداسیپکسوریک، پراسیتامول، آتورواستاتین، کونواژول، ابیراکونواژول، فلوکوناژول، کلانترامایکسولین، ابیریتروناید، دیتازپارم، ایندیناژول، سیکسپورومین، لوتوزیرین، دیوالدام، تنوفیلین، ملاتونین و تیازیدین و گیاه چای.

عوارض جانبی احتمالی مصرف داینویژیل-آی اچ چه می باشد:

هر دارو به میزان اثر درمانی ممکن است باعث بروز عوارض جانبی شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود.

ولی در صورت بروز عوارض زیر، با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

عوارض معمول: در ناحیه پستان، سردرد.

عوارض غیر معمول: التهاب وائرن، دهانه وائرن، کاندیدیاپریس وائرن یا عفونت قارچی دهانه وائرن، تغییر در اشتها (افزایش اشتها)، خارش و خوق افسرده، گیجی، میگرن، افت فشار خون، افزایش فشارخون، تهوع، استفراغ، اسهال، آلوپسی (ریزش منطقه ای مو)، خارش خارش آکنه، خونریزی های غیر طبیعی، خونریزی های غیر طبیعی، خستگی، بزرگ پستان، تورم پستان، دردهای قاعدگی، ترشحات وائرن، گیست نخمدان، درد لگن، سندرمی و تغییرات وزن.

آیا می دانید در صورت مشاهده هر گونه عارضه جانبی می توانید از پزشک یا داروساز خود بخواهید مصرف این ADR را برای شما تشکیل نماید؟ (کارت زرد ADR در راستای ارتقا، گزارش دهی عوارض دارویی تهیه شده است).

داینویژیل-آی اچ چگونه نگهداری می‌شود:

– دارو را دروزار دید و دسترس کودکان نگهداری کنید.

– دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

– از زمانی که قرص خود را مصرف می‌کنید، در بسته بندی این نگهداری کنید.

– از مصرف دارو در حمام، شاتر، سینک، بشقاب ظرف و نیز بسته بندی خود گذشتن آن در خودر خودداری کنید.

– از مصرف دارو پس از تاریخ انقضای درج شده در بسته بندی خودداری کنید.

توصیف محصول: شکل ظاهری داینویژیل-آی اچ و نحوه عرضه آن چگونه است:

قرص داینویژیل-آی اچ به صورت آبی، گرد، محدب روشک‌دار می‌باشد که در جبهه ۲۱ عددی (حاوی یک داینویژیل کارت ۲۱ عددی)، هر سه را برکه راهنما می‌دهد.

نویله کنید:

داینویژیل-آی اچ محصول شرکت ایران هورمون می باشد. ۱ کیلوستر ۱۱ جاذبه مخصوص، صندوق پستی ۱۳۱۸۵۱۷۷، تهران، ایران. ۱۲۰۹۵۵۱۷۰۹۲۱۴۴۰۹۸۲ (داخلی:۳۵)

تاریخ بازنگری: ۱۳۹۸/۷/۱۶



شرکت داروسازی ایران هورمون

IRAN HORMONE PHARMACEUTICAL Co.