

آن صرف نظر کنید و توجه داشته باشید مقدار دارو در یک وعده را دو برابر مصرف ننمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

از مهمترین این عوارض می توان به گیجی، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، سرفه، تب و گلو درد اشاره کرد.

عوارضی که در صورت تداوم و یا شدت یافتن نیاز به توجه پزشکی دارند:

سردرد، درد پشت، اسهال، خستگی، احتقان بینی، سرفه های خشک، بی خوابی، پادرد، گرفتگی عضلات و مشکلات در سینوس ها.

مسمومیت:

در صورت مصرف بیش از حد دارو، افت شدید فشار خون، افزایش ضربان قلب و در بعضی موارد کندی ضربان قلب مشاهده می شود. در این صورت بیمار را به اولین مرکز درمانی انتقال دهید.

شرایط نگهداری:

– دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

– دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه

ساتی گراد نگهداری نمایید.

– از مصرف داروهای تاریخ گذشته اجتناب نمایید.

Lotensin 25 & 50

Losartan

F.C. Tablet

لوتنسن ۲۵ و ۵۰

لوزارتان

قرص روکش دار

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

– در صورت داشتن حساسیت به این دارو یا داروهای مشابه، سایر غذاها، رنگ ها و مواد محافظ.

– در صورت استفاده از هر نوع داروی دیگر خصوصاً داروهای مدر، سیکلوسپورین، فرآورده های حاوی پتاسیم، پسودوافدرین، ضدالتهاب های غیر استروئیدی شبیه ایندومتاسین.

– در صورت ابتلا، به بیماری های کلیوی، کبدی، اسهال شدید و کاهش حجم آب بدن به هر دلیل.

مصرف در بارداری و شیردهی:

– مصرف این دارو در دوران شیردهی اکیداً ممنوع می باشد و در دوران بارداری نیز فقط در صورت ملاحظه پزشک متخصص قابل تجویز است.

– مصرف این دارو حتی برای زنانی که قصد بارداری شدن را دارند توصیه نمی شود، در این صورت به پزشک معالج حتما اطلاع دهید.

هشدارها:

– در صورت وقوع حاملگی بلافاصله به پزشک اطلاع دهید.

– این دارو را به مقدار تجویز شده مصرف کنید.

– از مصرف الکل و همچنین انجام ورزش های شدید که باعث دفع آب بدن و تعریق زیاد می شود، به همراه این دارو خودداری کنید.

– در صورت بروز هر گونه ناراحتی شدید دستگاه گوارش، اسهال، استفراغ و اختلال در کار کلیه، به پزشک خود مراجعه نمایید.

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:

بزرگسالان: دوز اولیه ۵۰ میلی گرم یکبار در روز.

دوز نگهدارنده: ۲۵ تا ۱۰۰ میلی گرم در روز در یک یا دو نوبت منقسم.

توجه: این دارو را در کودکان با نظر پزشک مصرف نمایید.

در صورت فراموش کردن هر وعده بلافاصله بعد از به یادآوردن دارو را مصرف کنید ولی چنانچه نزدیک زمان بعدی بود از مصرف

